

参考答案

数学(人教版) 七年级上册

第一章 有理数

1.1 正数和负数

第1课时 正数和负数

【课堂导学】

任务一

探究1 解:零上5摄氏度用“5℃”表示;零下5摄氏度用“-5℃”表示.

探究2 解:表示零下5摄氏度的数字比表示零上5摄氏度的数字前多了一个符号“-”.

探究3 解:-7℃, -15℃.

类比探究

(1)+20 (2)-0.5%

新知生成 (1)大于0 - + (2)+ - (3)0

【即时测评】

1. -4℃

2. 甲 丙

任务二

例 解:(1)+5 -8

(2)比标准质量多7g 比标准质量少4g

类比学习 -8 -47 举例略

【即时测评】

1. 解:增加108件,表示为+108件;减少81件,表示为-81件;增加53件,表示为+53件.

2. 解:这个物体又移动了-1m表示物体又向左移动1m. 此时物体回到了初始位置.

【课堂小结】

具有相反意义

【当堂检测】

1. +30m -20m 0m 西 东

2. 解:潜水艇的高度为-40m,鲨鱼的高度为-30m.

【课后评价】

1. B 2. A 3. B 4. C 5. B 6. A 7. B

8. 收入120元 9. 向西走20m

10. A 11. B 12. 输2局

13. 解:由题意,得这5名同学的成绩分别为82分、99分、85分、90分、79分,所以这5名同学的平均成绩为 $(82+99+85+90+79) \div 5 = 87$ (分).

14. 解:(1)这名运动员头顶离水面的高度为 $10+1.75=11.75$ (m),表示为+11.75m,池底的深度表示为-5.4m. (2)以跳台为基准,池底距跳台 $10+5.4=15.4$ (m),则池底的深度表示为-15.4m,水面的高度表示为-10m.

第2课时 正数和负数的意义

【课堂导学】

任务一

探究1 解:+8848.86m表示比海平面高8848.86m;-154.31m表示比海平面低154.31m.

探究2 解:以海平面为基准,0m表示海平面的海拔.

探究3 解:0℃是一个确定的温度.

[归纳总结] (1)正数 负数 (2)没有

【即时测评】

(1)-5m (2)向东运动6m 静止不动

任务二

情境1 解:(1)六个国家该年商品进出口总额的增长率:美国-6.4%,德国1.3%,法国-2.4%,英国-3.5%,意大利0.2%,中国7.5%.

(2)减少了6.4%

情境2 解:(1) ± 5 g表示零食的质量在195g至205g为合格质量.

(2)这种零食最重为205g,最轻为195g.

(3)这5袋产品中合格的为198g, 200g, 201g.

【即时测评】

1. -6 没有收入,也没有支出

2. 比标准质量500g多5g 比标准质量500g少5g

【课堂小结】

正数 负数 亏损

【当堂检测】

1. B 2. 甲比乙小3岁

3. 解:(1)+10%表示比标准价格高10%,-10%表示比标准价格低10%.

(2)最高价格为220元,最低价格为180元.

(3)(200 $\pm$ 20)元.

【课后评价】

1. C 2. B 3. -6cm, -1cm, 0cm

4. D 5. A

6. (1)飞机下降200m

(2)铝球的质量高于标准质量2g

(3)木材公司售出木材2000m³

(答案均不唯一)

7. -10907m 8. C 9. A 10. D 11. -6

12. 解:(1)若节约为正,浪费为负,则节约水10m³表示为+10m³,浪费水0.5m³表示为-0.5m³.

(2)若注入为正,放出为负,则注入汽油4t表示为+4t,放出汽油1.8t表示为-1.8t.

(3)若零上为正,零下为负,则零上32℃表示为+32℃,零下56℃表示为-56℃.

13. 解:答案均不唯一.例如,(1)50

(2)填表如下:

原质量/kg	52	49	48	53	46	51	47	52
与基准数的差/kg	+2	-1	-2	+3	-4	+1	-3	+2

14. 解:(1)+11分.

(2)81分.

(3)87分.

1.2 有理数及其大小比较

第1课时 有理数的概念

【课堂导学】

任务一

回顾复习

(1) $\frac{1}{1}$ $\frac{0}{1}$ $-\frac{2}{1}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{133}{25}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{201}{4}$

$$-\frac{3}{4} \quad \frac{1}{3} \text{ (答案不唯一)}$$

问题探究 解：整数、有限小数和无限循环小数。

(2) 负整数 正分数 负分数

① 正整数 0 负整数 ② 正分数 负分数

新知生成 分数 可以写成正分数形式的数 可以写成负分数形式的数

[即时测评]

1. B

2. ③⑤

任务二

问题 1 0 正整数 正分数 负整数 负分数

问题 2 整数 分数 0

[即时测评]

解：正有理数集合： $\left\{+7, 2\frac{3}{5}, 6.7, 320, 0.123, \dots\right\}$ 。

整数集合： $\{+7, -63, 0, -7, 320, -53, \dots\}$ 。

非负有理数集合： $\left\{+7, 0, 2\frac{3}{5}, 6.7, 320, 0.123, \dots\right\}$ 。

负分数集合： $\left\{-\frac{1}{3}, -\frac{11}{13}, -0.618, -10\%, \dots\right\}$ 。

【课堂小结】

略

【当堂检测】

1. A 2. D

3. 正数集合： $15, \frac{2}{15}, 0.1, 123, 2.333$ ；

负数集合： $-\frac{1}{9}, -5, -\frac{13}{8}, -5.32, -80$ 。

【课后评价】

1. D

2. (1)× (2)× (3)√ (4)√ (5)×

3. C 4. B 5. D 6. B 7. 0

8. $4, 3.141\ 59, 0, \frac{2}{5}, 4, -2, 0, -2\frac{1}{2}, 3.141\ 59, \frac{2}{5}$

9. $-\frac{1}{2}$ (答案不唯一)

10. -1 (答案不唯一)

11. 3 解析：因为 $\frac{20}{19}, -\frac{1}{2}, -10.8$ 是分数，所以分数有 3 个。

12. 解：既是正数又是整数的集合是正整数；既是负数又是整数的集合是负整数。
故答案为正整数；负整数。

13. 解：(1) 负数集合： $\left\{-4, -\frac{4}{3}, -3.14, -(+5), \dots\right\}$ 。

(2) 正分数集合： $\left\{\frac{22}{7}, \dots\right\}$ 。

14. 解：正整数： $85, 25$ ；

负整数： $-6, -36$ ；

正分数： $0.3, \frac{10}{11}$ ；

负分数： $-1.2, -\frac{3}{7}, -3.45$ ；

正有理数： $85, 0.3, 25, \frac{10}{11}$ ；

负有理数： $-6, -1.2, -\frac{3}{7}, -36, -3.45$ 。

15. 解：(1) 由 A 和 4 的符号相同，可得 A 处的数是正数。

(2) 因为向下箭头上方的负数，下方的是正数，向上

箭头下方的是负数，上方的是正数，

所以正数排在 A 与 C 的位置。

(3) 由 $2\ 027 \div 4 = 506 \dots 3$ ，

得第 2 027 个数与第 3 个数位置一样，

所以第 2 027 个数是负数，排在 D 的位置。


第 2 课时 数轴

【课堂导学】

任务一

探究 1 解：先向西骑行 3 km 记作 -3 km，继续向西骑行 2 km 记作 -2 km。

探究 2 解：如图所示。



探究 3 解：C 村的位置表示 4。

探究 4 解：原点左边 1.5 个单位长度表示 -1.5 ，原点右边 1.5 个单位长度表示 $+1.5$ 。

新知生成 原点、正方向和单位长度

[即时测评]

解：(1) 错误，没有原点和单位长度；

(2) 正确；

(3) 错误，没有单位长度；

(4) 正确；


(5) 错误，单位长度不统一；

(6) 错误，原点左边的数从右向左应该是 $-1, -2, \dots$ 。

任务二

例 1 解：点 A 表示 -3 ；点 B 表示 2；点 C 表示 4；点 D 表示 0.5；点 E 表示 -2.5 。

例 2 解：如图。



【归纳总结】 (2) 正半轴 负半轴 (3) 正半轴 a 负半轴 a

[即时测评]

1. C 2. ± 3


【课堂小结】

原点 正方向 正 负

【当堂检测】

1. A 2. C

3. 解：补全数轴及在数轴上表示各数如下：



【课后评价】

1. B 2. D

3. B 解析：当点 M 位于点 N 左侧时，点 M 表示 -3 ；当点 M 位于点 N 右侧时，点 M 表示 5。


4. -2 5. -7 6. B 7. D

8. D 解析：因为圆的周长为 1 个单位长度，

所以当圆沿数轴向左滚动 1 周时，点 B 表示的数是 -2 ；当圆沿数轴向右滚动 1 周时，点 B 表示的数是 0。

9. C 10. D 11. 6 12. 6 13. 2 或 6

14. 解：(1) 如图。



(2) 若把数轴的原点取在点 B 处，则点 A 表示的数为 -2.5 。

故答案为 -2.5 。

15. 解：(1) 2

(2) ① -3

② 由表示数 3 的点与表示数 -1 的点重合，可知折叠点表示的数是 1，由题意可得，A、B 两点到折叠点的

距离为 $9 \div 2 = 4.5$.


因为折叠点表示的数是 1, 且点 A 在点 B 的左侧, 所以点 A 表示的数是 -3.5, 点 B 表示的数是 5.5.

第 3 课时 相反数

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: 如图.



每组中表示两个数的点都位于原点的两旁, 且与原点的距离相等.

探究 2 解: 数轴上与原点的距离是 4 的点有两个, 这两个点表示的数分别是 +4 和 -4.

数轴上与原点的距离是 $\frac{1}{2}$ 的点有两个, 这两个点表示的数

分别是 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$.

探究 3 解: 数轴上与原点的距离等于 a 的点有两个, 这两个点表示的数分别是 a 和 $-a$, 两个数只有符号不同.

新知生成 (1) 两正、负半轴上 a 和 $-a$ 符号

(2) 只有符号不同

(3) 负数 正数 0

(4) 两侧 原点

[即时测评]

(1) $\checkmark$ (2) $\times$ (3) $\times$ (4) $\checkmark$ (5) $\checkmark$ (6) $\times$

任务二

例 1 解: (1) -7 的相反数是 7, 3.5 的相反数是 -3.5.

(2) 因为 $-\frac{2}{13}$ 与 $\frac{2}{13}$ 互为相反数, 所以 a 的值为 $-\frac{2}{13}$.

例 2 解: (1) $-(+5)$ 表示 +5 的相反数, 化简的结果是 -5.

(2) $-(-5)$ 表示 -5 的相反数, 化简的结果是 5.

(3) -0 表示 0 的相反数, 化简的结果是 0.

[归纳总结] (2) $-a$ (3) 不一定

[即时测评]

1. 解: 6, -8, -3.9, 0, $\frac{5}{2}$, 100, $-\frac{2}{11}$ 的相反数分别是

-6, 8, 3.9, 0, $-\frac{5}{2}$, -100, $\frac{2}{11}$.

2. 解: $-(-6) = 6$; $-(+0.75) = -0.75$; $-(+3.8) = -3.8$; $-(-0) = 0$.

【课堂小结】

符号 两侧 相等

【当堂检测】

1. D 2. D 3. B

4. 点 B 和点 C


【课后评价】

1. B 2. D 3. 2 4. A 5. B 6. B 7. C 8. C 9. A

10. A 11. -7

12. 解: (1) -17 (2) $\frac{1}{2}$ (3) 35 (4) -9 (5) 75

13. 解: (1) $-a$, $-b$ 的位置如图所示.



(2) 数 b 与其相反数对应的点相距 20 个单位长度, 则数 b 对应的点到原点的距离为 10, 所以 b 是 -10.


(3) 因为 $-b$ 对应的点到原点的距离为 10, 而数 a 对应的点与数 b 的相反数对应的点相距 5 个单位长度, 所以数 a 对应的点到原点的距离为 5.

所以 a 是 5.

14. 解: (1) 因为以向右为正方向, a 在原点的左侧, b 在

原点的右侧, 所以 a 为负数, b 为正数.

(2) $-a$, $-b$ 的位置如图所示.



(3) 因为 a 与 $-a$ 相隔 2 026 个单位长度, 所以 a 与 $-a$ 都距离原点 1 013 个单位长度.

又因为 a 在原点的左侧,


所以 $a = -1\ 013$.

第 4 课时 绝对值

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: 如图.



探究 2 (1) 4 (2) 2.5

探究 3 解: 不都是, 也可以是 0.

新知生成 原点的距离 $|a|$ 10 10 0

[即时测评]

1. (1) 7 7 $|+7| = 7$

(2) 0 0 $|0| = 0$

(3) 6 6 $|-6| = 6$

2. (1) 0.1 (2) 101 (3) 7.5

[归纳总结] 本身 相反数 0 (1) a (2) 0 (3) $-a$

任务二

例 1 解: $|1| = 1$, $|-0.2| = 0.2$, $|\frac{7}{3}| = \frac{7}{3}$.

例 2 解: (1) 8. (2) $-\frac{2}{3}$. (3) 3. (4) 3.3.

[即时测评]

解: $|-21| = 21$, $|\frac{4}{9}| = \frac{4}{9}$, $|-7.8| = 7.8$, $|+3| = 3$.

[归纳总结] (1) 非负数 $\geq$ (2) 符号 绝对值

【课堂小结】

原点 距离 $\geq a -a 0$

【当堂检测】

1. A 2. D 3. 0 正数和 0 负数 4. -2

【课后评价】

1. A 2. B 3. C 4. A 5. C 6. B 7. A 8. C

9. C

10. D 解析: A. 当 $a = 0$ 时, $|a| = 0$, 0 既不是正数, 也不是负数, 故本选项不合题意;

B. 当 $a < 0$ 时, $-a$ 是正数, 故本选项不合题意;

C. 当 $a = 0$ 时, $-|a| = 0$, 0 既不是正数, 也不是负数, 故本选项不合题意;

D. 因为 $|a| \geq 0$, 所以 $|a| + 1 > 0$, 即 $|a| + 1$ 一定是正数, 故本选项符合题意.

11. C 解析: 因为 $|a| = a$, $|b| = -b$, $|a| > |b|$,

所以 $a > 0$, $b < 0$, a 与原点的距离大于 b 与原点的距离.

12. ± 3 13. -3

14. 解: $-(+\frac{1}{4}) = -\frac{1}{4}$.

$-(-5.7) = 5.7$.

$|-(+2)| = |-2| = 2$.

$|\frac{1}{9}| = \frac{1}{9}$.

$-|-8.1| = -8.1$.

15. 解: (1) 在数轴上与原点距离为 3 的点表示的数为 -3 或 3,

即 x 的值为 3 或 -3.

(2) 在数轴上与表示数 2 的点距离为 4 的点表示的数为 -2 或 6,

即 x 的值为 -2 或 6 .

(3) $|x-3|+|x-7|$ 表示一个数到 3 和 7 的距离之和, 当 x 在 3 和 7 之间时两者距离之和最小, 最小值为 $7-3=4$.

故答案为 4 .

第 5 课时 有理数的大小比较

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: $-7\ 11$


$-7\ ^\circ\text{C}$, $-4\ ^\circ\text{C}$, $-3\ ^\circ\text{C}$, $-1\ ^\circ\text{C}$, $0\ ^\circ\text{C}$, $1\ ^\circ\text{C}$, $2\ ^\circ\text{C}$.

探究 2 解: 依次把这些数表示在数轴上, 表示它们的各点按从左到右的顺序排列.

新知生成 小 大 小于

【即时测评】

解: 如图.



$-10 < -8 < -4 < 2 < 3 < 12$.

任务二

问题 1 解: 正数 $> 0 >$ 负数.

问题 2 解: 负数的绝对值越大, 在数轴上的位置越靠左.

【归纳总结】(1) 大于 大于 (2) 反而小

【即时测评】

(1) $<$ (2) $>$ (3) $<$ (4) $<$ (5) $>$

任务三

例 解: (1) $-(-2)=2$, $-(+3)=-3$.

因为正数大于负数,

所以 $2 > -3$, 即 $-(-2) > -(+3)$.

(2) $\left|-\frac{8}{21}\right|=\frac{8}{21}$, $\left|-\frac{3}{7}\right|=\frac{3}{7}=\frac{9}{21}$.

因为 $\frac{8}{21} < \frac{9}{21}$, 即 $\left|-\frac{8}{21}\right| < \left|-\frac{3}{7}\right|$,

所以 $-\frac{8}{21} > -\frac{3}{7}$.

(3) $-(-0.3)=0.3$, $\left|-\frac{1}{3}\right|=\frac{1}{3}$.

$0.3 < \frac{1}{3}$, 即 $-(-0.3) < \left|-\frac{1}{3}\right|$.

【即时测评】

1. 解: (1) $-3 - \frac{1}{2} < -2 - \frac{1}{3}$.

(2) $-\frac{3}{4} > -\frac{4}{5}$.

(3) $-\left(-\frac{3}{4}\right) = -[+(-0.75)]$.

2. 解: 哈尔滨.

【课堂小结】

小于 $>$ $>$ 反而小

【当堂检测】

1. D 2. D 3. A 4. D

5. 解: (1) $-\frac{7}{12} > -\frac{5}{6}$.

(2) $-\frac{9}{14} < -\frac{5}{8}$.

(3) $|-3| = -(+3)$.


(4) $-1 - \frac{2}{5} < -1 - \frac{1}{3}$.

【课后评价】

1. D 2. B 3. D 4. B 5. B 6. D 7. B 8. A

9. D 解析: 根据有理数 m, n 在数轴上对应点的位置, 得 $n < 0 < m$, 且 $|n| > |m|$, 所以有理数 $n, -m, m$,

$|n|$ 在数轴上的位置如图所示.



根据“在数轴上左边的点表示的数小于右边的点表示的数”, 得 $n < -m < 0 < m < |n|$.

10. -4 (答案不唯一)

11. $>$ 解析: $1 + \left(-\frac{2\ 025}{2\ 026}\right) = \frac{1}{2\ 026}$, $1 + \left(-\frac{2\ 026}{2\ 027}\right) = \frac{1}{2\ 027}$.

因为 $\frac{1}{2\ 026}$, $\frac{1}{2\ 027}$ 分子相同, 分母不同, 且 $2\ 026 < 2\ 027$,


所以 $\frac{1}{2\ 026} > \frac{1}{2\ 027}$, 所以 $-\frac{2\ 025}{2\ 026} > -\frac{2\ 026}{2\ 027}$.

12. $>$


13. 点 Q 解析: 因为点 M, N 表示的有理数互为相反数, 所以原点在 M, N 的中点处.

所以原点的位置大约在点 O (如图).

所以绝对值最大的数所对应的点是点 Q .



14. 解: (1) 如图.




(2) 由 (1) 可知 $-5 < -\frac{5}{2} < 0 < 3 - \frac{1}{2} < |-4|$.

15. 解: (1) 由所给数轴可知, $a < 0, b < 0, c > 0$.

故答案为 $<$; $<$; $>$.

(2) ① $-a$ ② $-b$ ③ c ④ $-a$ ⑤ $-b$ ⑥ c

(3) 将 $a, b, c, -a, -b, -c, 0$ 在数轴上表示出来如图所示.



所以 $b < a < -c < 0 < c < -a < -b$.

第二章 有理数的运算

2.1 有理数的加法与减法

第 1 课时 有理数的加法

【课堂导学】

任务一

探究 1 右 $9\ 6+3=9(\text{m})$

探究 2 解: 向左行走了 $9\ \text{m}$; $-6+(-3)=-9(\text{m})$.

探究 3 解: 向左行走了 $3\ \text{m}$; $-6+3=-3(\text{m})$.

探究 4 解: 向右行走了 $3\ \text{m}$; $6+(-3)=3(\text{m})$.

探究 5 解: 回到原点; $-6+6=0(\text{m})$.

探究 6 解: 向左(或右)行走了 $6\ \text{m}$; $-6+0=-6$ (或 $6+0=6$).

探究 7 解: 和的符号由加数的符号确定, 和的绝对值是加数的绝对值的和或差.

新知生成 ① 相同 加数的绝对值的和 ② 绝对值较大的加数 加数的绝对值中较大者与较小者的差 ③ 仍得这个数

【即时测评】

解: $(+2)+(+3)$ 表示 $+2$ 和 $+3$ 两个有理数的和, 结果为 5 ;

$(-2)+(+4)$ 表示 -2 和 $+4$ 的和, 结果为 2 .

任务二

例 1 解: (1) $(-24)+(+18) = -(24-18) = -6$.

(2) $(-10)+(-3) = -(10+3) = -13$.

(3) $(+15)+(-5) = +(15-5) = 10$.

$$(4) \left(+3\frac{1}{2}\right) + \left(-3\frac{1}{2}\right) = 0.$$

$$(5) 0 + \left(-13\frac{1}{2}\right) = -13\frac{1}{2}.$$

[归纳总结] 符号 绝对值

[即时测评]

$$(1) -8 \quad (2) 9 \quad (3) -13 \quad (4) -9$$

任务三

例2 解: 规定盈利为正, 亏损为负, $-48+26=-22$ (元).
答: 该商场卖出这两件衣服后的利润是-22元, 商场亏损了.

[即时测评]

$$\text{解: } 1.5 + (-0.3) = 1.2(\text{m}).$$

答: 蜗牛白天和夜间一共向上爬了 1.2 m.

【课堂小结】

相同 加数的绝对值的和 绝对值较大的加数的符号
加数的绝对值中较大者与较小者的差

【当堂检测】

1. C

2. D 解析: 规定上升为正, 下降为负, 由题意, 得 $-60+31=-29$ (m), 即潜水员在水下 29 m 处.

3. 解: (1) $(-25) + (-35) = -(25+35) = -60$.

$$(2) (-12) + (+3) = -(12-3) = -9.$$

$$(3) (+8) + (-7) = +(8-7) = 1.$$

$$(4) 0 + (-7) = -7.$$

【课后评价】

1. C 2. D 3. D 4. C 5. $-\frac{1}{5}$

6. 2 或 -8 解析: 因为 x 的相反数是 3, $|y|=5$,
所以 $x=-3$, $y=\pm 5$.

$$\text{当 } x=-3, y=5 \text{ 时, } x+y=-3+5=2;$$

$$\text{当 } x=-3, y=-5 \text{ 时, } x+y=-3+(-5)=-8.$$

7. B 8. D 9. C 10. B 11. $-\frac{3}{4}$

12. 解: (1) $15 + (-22) = -(22-15) = -7$.

$$(2) (-13) + (-8) = -(13+8) = -21.$$

$$(3) (-0.9) + 1.5 = 1.5 - 0.9 = 0.6.$$

$$(4) \frac{1}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{6}.$$

13. 解: (1) -20 的相反数是 20, 则 $20 + (-10) = 10$.

$$(2) 45 \text{ 的相反数是 } -45, |-15|=15, \text{ 则 } -45+15=-30.$$

14. 解: (1) 规定: 向右记为正, 向左记为负. 由题意, 得 $(-3)+2=-1$, 结果一致.

(2) $(-3) + (-2)$ 可以解释为小明从原点出发, 沿着数轴先向左移动 3 个单位长度, 再向左移动 2 个单位长度, 最后他到达原点左边 5 个单位长度处, 算式为 $(-3) + (-2) = -5$. (答案不唯一)

15. 解: (1) 因为 $|a|=8$, $|b|=2$, 且 a, b 同号,
所以 $a=8, b=2$ 或 $a=-8, b=-2$.

所以 $a+b$ 的值为 10 或 -10.

(2) 因为 $|a|=8$, $|b|=2$, 且 a, b 异号,

所以 $a=8, b=-2$ 或 $a=-8, b=2$.

所以 $a+b$ 的值为 6 或 -6.

第 2 课时 有理数加法的运算律

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: ① -2 -2 ② 8 8

(1) 两个算式交换加数的位置, 算式的结果不变.

(2) 举例略. 所得结果和 (1) 的结论相同.

(3) 适用.

探究 2 解: ① -1 -1 ② -9 -9

(1) 两个算式均为三个数相加, 一个先让前两个数相加, 另一个先让后两个数相加, 结果相等.

(2) 适用.

新知生成 不变 $a+b=b+a$ 不变 $(a+b)+c=a+(b+c)$

[即时测评]

B

任务二

例 1 解: (1) $16 + (-25) + 24 + (-35)$

$$= (16+24) + [(-25)+(-35)]$$

$$= 40 + (-60)$$

$$= -20.$$

$$(2) (-2.48) + 4.33 + (-7.52) + (-4.33)$$

$$= [(-2.48)+(-7.52)] + [4.33+(-4.33)]$$

$$= -10 + 0 = -10.$$

$$(3) -\frac{5}{4} + 3 + \frac{1}{4} + (-3) = [3+(-3)] + \left(-\frac{5}{4} + \frac{1}{4}\right) = 0 + (-1) = -1.$$

[即时测评]

解: (1) 原式 $= [(-19)+(-31)] + [(-40)+(+28)] = -50 + (-12) = -62$.

$$(2) \text{原式} = \left(-2\frac{1}{4}\right) + \left[\left(-5\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right)\right] = \left(-2\frac{1}{4}\right) + (-5) = -\frac{29}{4}.$$

$$(3) \text{原式} = [(-2.78) + (-4.05) + (-5.17)] + [2.14 + (-2.14)] = -12 + 0 = -12.$$

任务三

例 2 解法 1: $91+91+91.5+89+91.2+91.3+88.7+88.8+91.8+91.1=905.4(\text{kg})$

$$905.4-90\times 10=5.4(\text{kg})$$

解法 2: $+1, +1, +1.5, -1, +1.2, +1.3, -1.3, -1.2, +1.8, +1.1$

$$1+1+1.5+(-1)+1.2+1.3+(-1.3)+(-1.2)+1.8+1.1=[1+(-1)]+[1.2+(-1.2)]+[1.3+(-1.3)]+$$

$$(1+1.5+1.8+1.1)=5.4(\text{kg})$$

$$90\times 10+5.4=905.4(\text{kg})$$

[即时测评]

解: (1) $+9+(-3)+(-5)+(+4)+(-8)+(+6)+(-3)+(-6)+(-4)+(+10)$

$$= 9+10+[4+(-4)]+[6+(-6)]+[(-3)+(-5)+(-8)+(-3)]$$

$$= 19+(-19)$$

$$= 0(\text{km}).$$

所以将最后一名乘客送到目的地时出租车又回到了出发点.

$$(2) |+9|+|-3|+|-5|+|+4|+|-8|+|+6|+|-3|+|-6|+|-4|+|+10|$$

$$= 9+3+5+4+8+6+3+6+4+10$$

$$= 58(\text{km}).$$

$$58\times 2.4=139.2(\text{元}).$$

所以司机一个下午的营业额是 139.2 元.

【课堂小结】

不变 $a+b=b+a$ 不变 $(a+b)+c=a+(b+c)$

【当堂检测】

$$1. (1) -12 \quad (2) -0.9 \quad (3) \frac{2}{3}$$

2. 解: 根据题意, 得 $35+(+4)+(4.5)+(-1)+(-2.5)+(-6)=34$ (元).

答: 在星期五收盘时, 每股的价格是 34 元.

【课后评价】

1. D 2. C 3. 加法交换律 加法结合律

4. C 5. D 6. -0.1 7. D

8. 1 013 解析: $(-1)+2+(-3)+4+\cdots+(-2\ 025)+2\ 026$
 $=[(-1)+2]+[(-3)+4]+\cdots+[(-2\ 025)+2\ 026]$
 $=1+1+\cdots+1=1\ 013.$

9. B 10. B

11. -50 解析: $1-2+3-4+\cdots+99-100$
 $=(1-2)+(3-4)+\cdots+(99-100)$
 $=-1+(-1)+(-1)+\cdots+(-1)=-50.$

12. 解: $(1)22+(-13)+18=(22+18)+(-13)=40+(-13)=27.$

$(2)(-2.8)+(-3.6)+(-1.5)+3\frac{3}{5}=[(-2.8)+(-1.5)]+[(-3.6)+3.6]=-4.3+0=-4.3.$

$(3)\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{1}{2}+\frac{3}{5}+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)=[\left(-\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)]+\left[\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)\right]+\frac{3}{5}=-1+0+\frac{3}{5}=-\frac{2}{5}.$

13. 解: $+4.5+(-4)+(+2.8)+(-3.2)+(+2.7)+(-0.2)=2.6(\text{kg}),$
 $50\times 6+2.6=302.6(\text{kg}).$

答: 这 6 袋大米共超过标准 2.6 kg, 总质量是 302.6 kg.

14. 解: $\left(-2\ 026\frac{5}{6}\right)+\left(-2\ 025\frac{2}{3}\right)+\left(-1\frac{1}{2}\right)+4\ 052$
 $=\left[(-2\ 026)+\left(-\frac{5}{6}\right)\right]+\left[(-2\ 025)+\left(-\frac{2}{3}\right)\right]+$
 $\left[(-1)+\left(-\frac{1}{2}\right)\right]+4\ 052$
 $=[(-2\ 026)+(-2\ 025)]+(-1)+4\ 052]+$
 $\left[\left(-\frac{5}{6}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$
 $=0+(-2)$
 $=-2.$

第 3 课时 有理数的减法

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: $8^{\circ}\text{C}.$

探究 2 解: $8^{\circ}\text{C}.$

探究 3 解: $3-(-5)$, 结果是 8.

探究 4 解: 减 -5 相当于加 5. 发现略.

探究 5 解: 2 2 9 9

结论: 减去一个数等于加上这个数的相反数.

新知生成 相反数 $(-b)$

[即时测评]

(1)2 (2) (-2) (3) (-7) (4) (-7)

任务二

例 1 解: $(1)-3-(-7)=-3+7=4.$

$(2)0-3=0+(-3)=-3.$

$(3)7.2-(-2.8)=7.2+2.8=10.$

$(4)\left(-3\frac{1}{2}\right)-5\frac{3}{4}=\left(-3\frac{1}{2}\right)+\left(-5\frac{3}{4}\right)=-9\frac{1}{4}.$

[即时测评]

(1)-5 (2)5 (3)0 (4)7 (5)-10 (6) $-\frac{1}{15}$

[归纳总结] 正 负 0

任务三

例 2 解: $8\ 848.86-(-155)=9\ 003.86(\text{m}).$

答: 两处高度相差 9 003.86 m.

[即时测评]

D

【课堂小结】

这个数的相反数 $(-b)$

【当堂检测】

1. C 2. D

3. 92 解析: 由题意可知, 最高处为 -37 m, 最低处为 -129 m, 所以 $(-37)-(-129)=-37+129=92(\text{m}).$

4. (1)16.56 (2) $-2\frac{3}{8}$ (3)-28.5 (4) $-1\frac{1}{3}$

【课后评价】

1. B 2. B 3. C 4. D 5. A 6. B 7. A 8. B

9. C 解析: 因为 $a-b>0$, 所以 $a>b$.

因为 $a+b<0$,

所以 a, b 同负, 或 a, b 异号且负数的绝对值较大.

当 a, b 同负时, 因为 $a>b$, 所以 $|b|>|a|$;

当 a, b 异号时, 因为 $a>b$, 所以 b 为负数, 且 $|b|>|a|$.

10. A 11. C 12. 1 或 -5 13. 0.6

14. 解: $(1)(-37)-(-47)=(-37)+47=10.$

$(2)(-53)-16=(-53)+(-16)=-69.$

$(3)(-210)-87=(-210)+(-87)=-297.$

$(4)1.3-(-2.7)=1.3+2.7=4.$

15. 解: $(1)10$ $(2)3$

(3) 由题意, 得 $|m-2|=5$,

解得 $m=-3$ 或 $m=7$.

所以 m 的值为 -3 或 7.

第 4 课时 有理数的加减混合运算

【课堂导学】

任务一

问题 1 解: 原式 $=(-40)+(-27)+19+(-24)+(+32).$

问题 2 解: 原式 $=-40.$

[即时测评]

解: $(1)(-30)+(+4)+6+(-8).$

$(2)-30, +4, +6, -8.$

$(3)-28.$

任务二

探究 1 解: 方法 1: $4.5+(-3.2)+1.1+(-1.4)$

$=4.5+1.1+[(-3.2)+(-1.4)]$

$=5.6+(-4.6)$

$=1(\text{km}).$

方法 2: $4.5-3.2+1.1-1.4=1.3+1.1-1.4=2.4-1.4=1(\text{km}).$

探究 2 解: 方法 1 是有理数的加法运算, 利用了有理数的运算律, 方法 2 是有理数的加减混合运算, 从左到右依次计算.

[归纳总结] 括号及其前面的加号 正 4.5、负 3.2、正 1.1 与负 1.4 的和 4.5 减 3.2 加 1.1 减 1.4

[即时测评]

解: 原式 $=2\frac{1}{5}+\frac{3}{5}-\frac{4}{5}=2.$

任务三

例 解: (1) 原式 $=-9+2-3-4=-14.$

(2) 原式 $=\frac{5}{6}-\frac{2}{3}+1\frac{1}{6}-\frac{1}{3}=1.$

[即时测评]

解: $(1)(-2)+(+30)-(-15)-(+27)=-2+30+15-27=16.$

$(2)14-25+12-17=(14+12)-(25+17)=26-42=-16.$

任务四

解: (1) 它们之间的距离分别为 1, 5, 8, 4.

(2)点A,B之间的距离等于 $|a-b|$.

【即时测评】

解: (1) 

(2) $3-(-5)=3+5=8(\text{km})$ 或 $|-5-3|=8(\text{km})$.

答: 小明家距小彬家 8 km.

(3) $|3|+|1.5|+|-9.5|+|5|=3+1.5+9.5+5=19(\text{km})$.

答: 货车一共行驶了 19 km.

【课堂小结】

加法 加法 减法

【当堂检测】

1. D 2. 17.6

3. 解: (1) $(-7)-(+5)+(-4)-(-10)=-7-5-4+10=-16+10=-6$.

(2) $1-4+3-0.5=1+3-4-0.5=0-0.5=-0.5$.

(3) $\frac{3}{4}-\frac{7}{2}+\left(-\frac{1}{6}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{3}{4}-\frac{7}{2}-\frac{1}{6}+\frac{2}{3}=$

$\frac{3}{4}+\frac{2}{3}-\frac{7}{2}-\frac{1}{6}=1\frac{5}{12}-3\frac{2}{3}=-2\frac{1}{4}$.

(4) $-2.4+3.5-4.6+3.5=3.5+3.5-2.4-4.6=7-7=0$.

【课后评价】

1. C 2. D 3. A 4. -4 5. 1 0

6. -6 解析: 由数轴, 得 $b=-4$, $c=a+2$,

所以 $a+b-c=a+(-4)-(a+2)=a-4-a-2=-6$.

7. C 8. B 9. 9 10. 盈利 4 11. 0

12. 解: (1)原式 $=6+6-22=12-22=-10$.

(2)原式 $=12+18-7-15=30-7-15=23-15=8$.

(3)原式 $=\left(3\frac{1}{4}+5\frac{3}{4}\right)-\left(2\frac{3}{5}+8\frac{2}{5}\right)=9-11=-2$.

(4)原式 $=-\frac{2}{3}+5\frac{1}{6}+4\frac{5}{6}-9\frac{1}{3}=$

$\left(-\frac{2}{3}-9\frac{1}{3}\right)+\left(5\frac{1}{6}+4\frac{5}{6}\right)=-10+10=0$.

13. 解: (1)根据题意, 得 $5-3+10-8-6+12-10=0(\text{m})$, 故守门员最后回到了球门的位置.

(2)离开球门的位置的距离分别是 5 m, 2 m, 12 m, 4 m, 2 m, 10 m, 0 m,

所以守门员离开球门的位置最远是 12 m.

(3)总路程为 $|5|+|-3|+|+10|+|-8|+|-6|+|+12|+|-10|=54(\text{m})$.

14. 解: (1)① $21-7$

② $\frac{4}{5}-\frac{1}{2}$

(2)原式 $=\frac{150}{557}-\frac{1}{5}+\frac{1}{2}-\frac{150}{557}-\frac{1}{2}$

$=\frac{150}{557}-\frac{150}{557}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{5}$

$=-\frac{1}{5}$.

2.2 有理数的乘法与除法

第1课时 有理数的乘法

【课堂导学】

任务一

探究1 解: 正 $\times$ 正, 正 $\times$ 0, 正 $\times$ 负; $0\times$ 正, 0×0 , $0\times$ 负; 负 $\times$ 正, 负 $\times 0$, 负 $\times$ 正.可进一步分类为同号相乘、异号相乘和与0相乘三类.

探究2 解: (1)结果依次减4; $-4 -8 -12$

(2)结果依次减4; $-4 -8 -12$

(3)正数乘正数, 积为正数; 正数乘负数, 积为负数; 负数

乘正数, 积为负数; 积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

探究3 解: (1) $-8 -4 0$; 结果依次加4.

(2)4 8 12

(3)负数乘负数, 积为正数, 积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

新知生成 正 负 乘数的绝对值 0

【即时测评】

1. B

2. B 解析: 由题意, 得 $b<0<a$, 并且 $|a|<|b|$,

所以 $-b>a$, 故A选项错误;

$ab<0$, 故B选项正确;

$a+b<0$, 故C选项错误;

$b-a<0$, 故D选项错误.

任务二

例1 解: (1) $(-1)\times 6=-(1\times 6)=-6$.

(2) $(-3)\times\left(-\frac{1}{3}\right)=+\left(3\times\frac{1}{3}\right)=1$.

(3) $\left(-\frac{6}{7}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=+\left(\frac{6}{7}\times\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{7}$.

【归纳总结】 (1)乘积是1 (2)0 符号 绝对值

【即时测评】

1. (1)-84 (2)16 (3)156 (4)-180

2. 解: $1, -1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 5, -5, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}$ 的倒数依次为

$1, -1, 3, -3, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}$.

任务三

例2 解: $(-6)\times 2.5=-15(^{\circ}\text{C})$.

答: 登高 2.5 km 后, 气温下降 15°C .

【即时测评】

解: $3\times 4=12(\text{cm})$, $(-5)\times 4=-20(\text{cm})$.

答: 甲水库水位上升 12 cm, 乙水库水位下降 20 cm.

【课堂小结】

正 负 1

【当堂检测】

1. C 2. A

3. B 解析: 因为 $xy<0$, $y=2$, 所以 $x<0$.

又因为 $|x|=3$, 所以 $x=-3$.

所以 $x-y=(-3)-2=-5$.

4. 解: (1) $6\times(-9)=-6\times 9=-54$.

(2) $(-6)\times(-1)=6\times 1=6$.

(3) $\frac{5}{6}\times(-9)=-\frac{5}{6}\times 9=-\frac{15}{2}$.

(4) $0\times(-9)=0$.

【课后评价】

1. B 2. C 3. D 4. C 5. $\frac{1}{7}$ 6. D 7. B

8. A 9. A 10. D 11. 0 10 -2 12. -15

13. ± 1 0 非负数

14. 解: (1) $\frac{5}{7}\times\left(-\frac{14}{15}\right)=-\frac{5}{7}\times\frac{14}{15}=-\frac{2}{3}$.

(2) $(-8)\times(-0.25)=+(8\times 0.25)=2$.

(3) $\left(-\frac{2\ 025}{2\ 026}\right)\times 0=0$.

(4) $\frac{2}{3}\times\left(-\frac{9}{4}\right)=-\frac{2}{3}\times\frac{9}{4}=-\frac{3}{2}$.

15. 解: (1) $3\times(-4)=4\times 3\times(-4)=-48$.

(2) $(-2)\times(6\times 3)$

$=(-2)\times(4\times 6\times 3)$

$=(-2)\times 72$

$=4\times(-2)\times 72$

$=-576$.

第2课时 有理数乘法的运算律

【课堂导学】

任务一

探究1 解：(1)-12 (2)-12 所得积相同

新知生成 不变 $ab=ba$

探究2 解：(1)60 (2)60 积相同

新知生成 不变 $(ab)c=a(bc)$

探究3 解：(1)-9 (2)-9 所得结果相同

新知生成 相乘 相加 $a(b+c)=ab+ac$

【即时测评】

1. A

2. 0 解析：由题意，得 $(-3) \times (-2) \times (-1) \times 0 \times 1 \times 2 \times 3 = 0$.

任务二

探究1 解： $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{6}\right) \times 18 = \frac{7}{18} \times 18 = 7$.

探究2 解： $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{6}\right) \times 18 = \frac{1}{3} \times 18 - \frac{1}{9} \times 18 + \frac{1}{6} \times 18 = 6 - 2 + 3 = 7$. 使用了乘法对加法的分配律.

探究3 解：探究2的方法更简便.

【即时测评】

解：(1)原式 $= \left(-\frac{5}{6}\right) \times (5.6 + 6.4)$

$$= \left(-\frac{5}{6}\right) \times 12 \\ = -10.$$

$$(2) \text{原式} = (-24) \times \frac{1}{3} + (-24) \times \left(-\frac{3}{4}\right) + (-24) \times \frac{1}{6} + (-24) \times \left(-\frac{5}{8}\right) \\ = -8 + 18 - 4 + 15 \\ = 21.$$

任务三

例 解：(1) $(-25) \times 85 \times (-4) = (-25) \times (-4) \times 85 = 8500$.

$$(2) \left(-\frac{17}{8}\right) \times (-1) \times \left(-\frac{8}{17}\right) \times 6 = \left(-\frac{17}{8}\right) \times \left(-\frac{8}{17}\right) \times (-1) \times 6 = -6.$$

$$(3) (-3) \times (-4) \times (-5) \times (-6) = (-4) \times (-5) \times (-3) \times (-6) = 360.$$

【归纳总结】 正数 负数 0

【即时测评】

解：(1) $3 \times (-6) = 3 \times 3 \times (-6) = -54$.

$$(2) (-3) \times (2 \times 4) \\ = (-3) \times (3 \times 2 \times 4) \\ = (-3) \times 24 \\ = 3 \times (-3) \times 24 \\ = -216.$$

【课堂小结】

绝对值 $ab=ba$ $(ab)c=a(bc)$ $a(b+c)=ab+ac$

【当堂检测】

1. A 2. A

$$3. \text{解：(1)} \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{18}\right) \times (-36) \\ = \frac{2}{9} \times (-36) - \frac{1}{4} \times (-36) + \frac{1}{18} \times (-36) \\ = -8 + 9 - 2 = -1. \\ (2) 99 \frac{71}{72} \times (-36) \\ = \left(100 - \frac{1}{72}\right) \times (-36)$$

$$= 100 \times (-36) - \frac{1}{72} \times (-36)$$

$$= -3600 + \frac{1}{2} = -3599 \frac{1}{2}.$$

$$(3) (-48) \times 0.125 + 48 \times \frac{11}{8} + (-48) \times \frac{5}{4} \\ = 48 \times \left(-\frac{1}{8}\right) + 48 \times \frac{11}{8} + 48 \times \left(-\frac{5}{4}\right) \\ = 48 \times \left(-\frac{1}{8} + \frac{11}{8} - \frac{5}{4}\right) = 48 \times 0 = 0.$$

【课后评价】

1. D 2. A 3. B 4. D

5. D 解析：几个非0有理数相乘，当负因数有奇数个时，积为负，故A、B、C选项错误；

D.几个有理数相乘，当积为负数时，负因数有奇数个，说法正确，符合题意.

6. C

7. B 解析： $(-2027) \times 62$

$$= (-2027) \times (63 - 1) \\ = (-2027) \times 63 + (-2027) \times (-1) \\ = p + 2027.$$

8. C 9. -120 10. 21 11. 75 -30

$$12. \text{解：(1)原式} = \left(-\frac{1}{12}\right) \times (-36) - \frac{1}{36} \times (-36) + \frac{1}{6} \times (-36) \\ = 3 + 1 - 6 \\ = -2.$$

$$(2) \text{原式} = \left(-100 + \frac{1}{12}\right) \times 24$$

$$= -100 \times 24 + \frac{1}{12} \times 24 \\ = -2400 + 2 \\ = -2398.$$

$$(3) \text{原式} = \frac{3}{7} \times (-6 + 4 - 5) \\ = \frac{3}{7} \times (-7) \\ = -3.$$

$$(4) \text{原式} = -\frac{3}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{8}{3} \\ = -1.$$

$$13. \text{解：原式} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{4} \times \frac{7}{6} \times \cdots \times \frac{21}{20} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{7} \times \cdots \\ \times \frac{20}{21} \\ = \left(\frac{3}{2} \times \frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{5}{4} \times \frac{4}{5}\right) \times \left(\frac{7}{6} \times \frac{6}{7}\right) \times \cdots \times \left(\frac{21}{20} \times \frac{20}{21}\right) \\ = 1 \times 1 \times 1 \times \cdots \times 1 \\ = 1.$$

第3课时 有理数的除法

【课堂导学】

任务一

探究1 解：6 3 3 =

探究2 解： $-8 \div 4 = -2$ $(-8) \div (-2) = (-8) \times \left(-\frac{1}{2}\right)$

探究3 解：因为 $(-2) \times (-6) = 12$ ，所以 $12 \div (-6) = -2$.

新知生成 (1)不等于0 倒数 $a \cdot \frac{1}{b}$

(2)正 负 被除数的绝对值除以除数的绝对值的商 0

【即时测评】

1. C 2. -1 0 3. -1

任务二

例 1 解: (1) $(-27) \div 9 = -(27 \div 9) = -3$.

$$(2) (-4) \div \left(-\frac{1}{4}\right) = -4 \times (-4) = 16.$$

[即时测评]

解: (1) $(-36) \div 3 = -(36 \div 3) = -12$.

$$(2) (-56) \div (-8) = 56 \div 8 = 7.$$

$$(3) 12 \div (-8) = -\frac{12}{8} = -\frac{3}{2}.$$

$$(4) 0 \div (-12) = 0.$$

任务三

例 2 解: (1) $-\frac{21}{7} = (-21) \div 7 = -3$.

$$(2) \frac{-28}{-16} = (-28) \div (-16) = 28 \div 16 = \frac{7}{4}.$$

[即时测评]

$$(1) -\frac{1}{3} \quad (2) -30 \quad (3) 0 \quad (4) \frac{27}{4}$$

【课堂小结】

$$a \cdot \frac{1}{b} \quad \text{正} \quad \text{负} \quad 0$$

【当堂检测】

1. C 2. C

3. A 解析: ①原式=3, 故①计算不正确;

②原式=20, 故②计算不正确;

③原式=1, 故③计算正确;

④原式= $\frac{15}{4} \times \frac{4}{5} = 3$, 故④计算不正确.

4. 除以一个不等于0的数, 等于乘这个数的倒数

5. 解: (1) 原式=0.

$$(2) \text{原式} = \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{8}.$$

【课后评价】

1. C 2. B 3. -1 4. $-\frac{2}{5}$ 5. -3

6. B 7. $\frac{7}{6}$ 8. C 9. B

10. C 解析: ①因为 $a < 0, b > 0, |a| > |b|$,

所以 $-a > b$, 故①符合题意;

②因为 $a < 0, b > 0$, 所以 $ab < 0$, 故②不符合题意;

③因为 $a < 0, b > 0$, 所以 $a - b < 0$, 故③符合题意;

④根据数轴上 a 距原点比 b 距原点的距离大, 得 $|a| > |b|$, 故④符合题意;

⑤因为 $a < 0, b > 0, |a| > |b|$, 所以 $a + b < 0$, 故⑤不符合题意;

⑥因为 $a < 0, b > 0$, 所以 $\frac{a}{b} < 0$, 故⑥符合题意.

11. -4 12. 8

13. 解: (1) 因为 a, b 互为相反数 ($a \neq b$),

$$\text{所以 } a = -b. \text{ 所以 } \frac{a}{b} = -1.$$

故答案为-1.

$$(2) \text{根据题意可知, } a + b = 0, c = -\frac{1}{5}, d = 1,$$

$$\text{所以 } a + b - c - d = 0 + \frac{1}{5} - 1 = -\frac{4}{5}.$$

$$14. \text{解: (1) } \left(-\frac{2}{3}\right) \div (-25) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{25} = \frac{2}{75}.$$

$$(2) (-7) \div \left(-1\frac{2}{5}\right) = 7 \times \frac{5}{7} = 5.$$

$$(3) \left(-\frac{3}{4}\right) \div 5 = -\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = -\frac{3}{20}.$$

$$(4) 2\frac{2}{3} \div \left(-2\frac{2}{3}\right) = -2\frac{2}{3} \div 2\frac{2}{3} = -1.$$

$$15. \text{解: (1) } -1 \triangle 2 = -1 \div \left(-\frac{2}{2}\right) = -1 \div (-1) = 1.$$

$$(2) \text{因为 } a \triangle b = \frac{1}{a} \div \left(-\frac{b}{2}\right),$$

$$\text{所以 } -2 \triangle 7 = -\frac{1}{2} \div \left(-\frac{7}{2}\right) = -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{2}{7}\right) = \frac{1}{7}.$$

$$\text{所以 } (-2 \triangle 7) \triangle 4 = \frac{1}{7} \triangle 4 = 7 \div \left(-\frac{4}{2}\right) = 7 \div (-2) = -\frac{7}{2}.$$

第4课时 有理数的混合运算

【课堂导学】

任务一

$$\text{例 1 解: (1) } \left(-120\frac{5}{6}\right) \div (-5) = 120\frac{5}{6} \times \frac{1}{5} = 120 \times \frac{1}{5} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{5} = 24\frac{1}{6}.$$

$$(2) -4.5 \div \frac{3}{8} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{9}{2} \times \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} = 3.$$

【归纳总结】 乘法

【即时测评】

$$\text{解: (1) } \left(-24\frac{3}{11}\right) \div 3 = \left(-24 - \frac{3}{11}\right) \times \frac{1}{3} = -24 \times \frac{1}{3} - \frac{3}{11} \times \frac{1}{3} = -8\frac{1}{11}.$$

$$(2) \left(-\frac{2}{3}\right) \times \frac{8}{5} \div (-0.125) = \frac{2}{3} \times \frac{8}{5} \times 8 = \frac{128}{15}.$$

任务二

$$\text{例 2 解: (1) } -5 + 4 \div (-2) = -5 - 2 = -7.$$

$$(2) (-8) \times (-5) - 120 \div (-15) = 40 + 8 = 48.$$

【归纳总结】 乘除 加减 左右

【即时测评】

$$\text{解: (1) } 5 - (-18) \div (-3) = 5 - 6 = -1.$$

$$(2) (-48) \div 3 - (-12) \times (-5) = -16 - 60 = -76.$$

任务三

例 3 解: 记盈利额为正数, 亏损额为负数, 这家公司去年全年总的盈亏为

$$(-1.5) \times 3 + 32 \times 3 + 21.7 \times 4 + (-2.3) \times 2$$

$$= -4.5 + 96 + 86.8 - 4.6$$

$$= 173.7 (\text{万元}).$$

答: 这家公司去年全年盈利 173.7 万元.

【即时测评】

$$\text{解: } 450 + 20 \times 60 - 12 \times 120$$

$$= 450 + 1200 - 1440$$

$$= 210 (\text{m}).$$

答: 这时直升机所在的高度是 210 m.

【课堂小结】

乘除 加减 左右 小括号

【当堂检测】

1. D

2. (1) 15 (2) 49

$$3. \text{解: (1) } \left[1 - \left(0.25 + \frac{3}{8}\right)\right] \div \frac{1}{4} = \left(1 - \frac{1}{4} - \frac{3}{8}\right) \times 4$$

$$= 1 \times 4 - \frac{1}{4} \times 4 - \frac{3}{8} \times 4 = 4 - 1 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$(2) 1\frac{1}{9} \div \left[32\frac{2}{5} - \left(32.4 - \frac{1}{3} \times 0.25\right)\right] \times 12$$

$$= \frac{10}{9} \div \left[32.4 - \left(32.4 - \frac{1}{12}\right)\right] \times 12$$

$$= \frac{10}{9} \div \left(32.4 - 32.4 + \frac{1}{12} \right) \times 12$$

$$= \frac{10}{9} \div \frac{1}{12} \times 12 = \frac{10}{9} \times 12 \times 12 = 160.$$

4. 解: $[5 - (-1)] \div 0.8 \times 100 = 6 \div 0.8 \times 100 = 750(\text{m})$.

答: 这个山峰的高度约为 750 m.

【课后评价】

1. D 2. C 3. C 4. B 5. C

6. -6 解析: 根据题意, 山顶比海拔 350 m 高 (2 350 - 350)m, 故山顶的气温为 $6 - \frac{2\,350 - 350}{100} \times 0.6 = -6(^{\circ}\text{C})$.

故答案为 -6.

7. A 解析: 因为 $|abc| = -abc$, 且 $abc \neq 0$, 所以 abc 中负数有 1 个或 3 个, 则原式的值为 1 或 -3.

8. $\frac{151}{6}$ 9. -9

10. 解: (1) $-4 - 28 - (-29) + (-24)$
 $= -4 - 28 + 29 - 24 = -27$.

$$(2) \frac{1}{6} + \left(-\frac{2}{7}\right) + \left(-\frac{5}{6}\right) - \left(+\frac{5}{7}\right)$$

$$= \frac{1}{6} - \frac{5}{6} - \frac{2}{7} - \frac{5}{7} = -\frac{4}{6} - \left(\frac{2}{7} + \frac{5}{7}\right)$$

$$= -\frac{2}{3} - 1 = -\frac{5}{3}.$$

$$(3) 1 \frac{1}{2} \times \frac{5}{7} - \left(-\frac{5}{7}\right) \times 2 \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \div 1 \frac{2}{5}$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{5}{7} + \frac{5}{7} \times \frac{5}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{5}{7}$$

$$= \frac{5}{7} \times \left(\frac{3}{2} + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{5}{7} \times \frac{7}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$(4) 39 \frac{24}{25} \times (-5) = \left(40 - \frac{1}{25}\right) \times (-5) = 40 \times (-5) - \frac{1}{25} \times (-5) = -200 + \frac{1}{5} = -\frac{999}{5}.$$

$$(5) -81 \div \frac{9}{4} \times \frac{4}{9} \div (-16) = -81 \times \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \times \left(-\frac{1}{16}\right) = 16 \times \frac{1}{16} = 1.$$

11. 解: (1) 最重的一袋比最轻的一袋重 $2 - (-3) = 2 + 3 = 5(\text{kg})$.

答: 最重的一袋比最轻的一袋重 5 kg.

$$(2) (-3) \times 1 + (-2) \times 4 + 2 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + (-1) \times 1 = 6(\text{kg}).$$

答: 20 袋大米总计超过 6 kg.

$$(3) 3.5 \times (30 \times 20 + 6) = 2\,121(\text{元}).$$

答: 出售这 20 袋大米可获得 2 121 元.

12. 解: (1) ①二 ②一

$$(2) \text{原式} = (-16) \div \left(-\frac{1}{12}\right) \times 12 = (-16) \times (-12) \times 12$$

$$= 2\,304.$$

$$(3) \text{原式} = (-24) \times \frac{7}{24} \times \frac{1}{14} = -\frac{1}{2}.$$

2.3 有理数的乘方

第 1 课时 乘方

【课堂导学】

任务一

(1) 9 (2) 27 (3) a^2 (4) a^3

类比探究

$$(1) 7^5 \quad (2) (-3)^4 \quad (3) \left(\frac{5}{6}\right)^4 \quad (4) 1^7$$

新知生成 (1) a^n a 的 n 次方 (2) 幂 底数 指数 a 的 n 次幂

(3) 1 次方

【即时测评】

$$1. (1) \times (2) \times (3) \checkmark (4) \times$$

$$2. (1) (-9) \times (-9) \times (-9)$$

$$(2) \frac{9}{7} \times \frac{9}{7} \times \frac{9}{7} \times \frac{9}{7}$$

$$(3) (a-b)(a-b)$$

$$3. (1) -5^2 \quad -5^2 \quad -5^2 \quad \text{次幂}$$

$$(2) 6^6 \quad 6^6 \quad \text{底数 指数}$$

任务二

例 解: (1) $(-5)^3 = (-5) \times (-5) \times (-5) = -125$.

$$(2) (-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81.$$

$$(3) \left(-\frac{3}{4}\right)^3 = \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{27}{64}.$$

【即时测评】

$$\text{解: (1)} (-1)^{10} = 1.$$

$$(2) (-6)^3 = -216.$$

$$(3) \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{8}.$$

$$(4) 0.1^5 = 0.000\,01.$$

【归纳总结】 (1) 负数 正数 (2) 正数 (3) 0 (4) 1

$$(5) 1 \quad -1$$

【课堂小结】

n 负数 正数 0

【当堂检测】

1. B 2. B

$$3. (1) -9 \quad (2) -9 \quad (3) -125 \quad (4) 0.008$$

$$(5) -1 \quad (6) 1 \quad (7) 1 \quad (8) -1 \quad (9) \pm 1$$

$$4. \text{解: (1)} 2^{2\,027} \times 3^{2\,027} = (2 \times 3)^{2\,027} = 6^{2\,027}; a^n \cdot 5^n = (5a)^n.$$

故答案为 $6^{2\,027}; (5a)^n$.

$$(2) (-0.125)^{2\,026} \times 8^{2\,027} = \left(-\frac{1}{8}\right)^{2\,026} \times 8^{2\,026} \times 8 =$$

$$\left(-\frac{1}{8} \times 8\right)^{2\,026} \times 8 = (-1)^{2\,026} \times 8 = 1 \times 8 = 8.$$

【课后评价】

1. C 2. A

3. B 解析: 根据题意可知, 一个草履虫细胞第 1 个 30 min 分裂成 2 个, 即 2^1 个细胞; 一个草履虫细胞第 2 个 30 min 分裂成 4 个, 即 2^2 个细胞……一个草履虫细胞第 n 个 30 min 分裂为 2^n 个细胞.

经过 8 h, 即 $2 \times 8 = 16$ (个) 30 min 后, 一个草履虫细胞可分裂为 2^{16} 个细胞.

4. C 5. D 6. C 7. -18 8. A 9. D 10. A 11. B

$$12. \text{C 解析: 原式} = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1$$

$$= 64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1$$

$$= 83.$$

13. C

14. C 解析: 假设面积为 1, 则 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5}$ 即为 ① + ② + ③ + ④ + ⑤ 的面积, 题图中阴影部分的面积为 $\frac{1}{2^5}$.

$$\text{所以 } ① + ② + ③ + ④ + ⑤ \text{ 的面积为 } 1 - \frac{1}{2^5} = \frac{31}{32}.$$

$$\text{所以 } \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} \text{ 的值为 } \frac{31}{32}.$$

15. 8

$$16. \text{解: (1) 设 } S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5. ①$$

将等式两边同时乘 3, 得

$$3S = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6. \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1}, \text{ 得 } 3S - S = 3^6 - 1,$$

$$\text{即 } 2S = 3^6 - 1.$$

$$\text{所以 } S = \frac{3^6 - 1}{2}.$$

$$\text{所以 } 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 = \frac{3^6 - 1}{2}.$$

$$\text{故答案为 } \frac{3^6 - 1}{2}.$$

$$(2) \text{ 设 } S = 1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \cdots + 7^{2\,025} + 7^{2\,026}. \textcircled{1}$$

将等式两边同时乘 7, 得

$$7S = 7 + 7^2 + 7^3 + 7^4 + \cdots + 7^{2\,026} + 7^{2\,027}. \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1}, \text{ 得 } 7S - S = 7^{2\,027} - 1,$$

$$\text{即 } S = \frac{7^{2\,027} - 1}{6}.$$

$$\text{所以 } 1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \cdots + 7^{2\,025} + 7^{2\,026} = \frac{7^{2\,027} - 1}{6}.$$

第 2 课时 含乘方的有理数的混合运算

【课堂导学】

任务一

问题 1 解: 含有加、减、乘、除、乘方运算.

问题 2 解: (1) $2 \div (2 \times 3)$ 先算乘法, 再算除法; $2 \div 2 \times 3$ 先算除法, 再算乘法.

(2) $2 \div \left(\frac{1}{2} - 2\right)$ 先算减法, 再算除法; $2 \div \frac{1}{2} - 2$ 先算除法, 再算减法.

(3) $6 \div (-3)^2$ 先算 $(-3)^2$, 再算除法; $6 \div (-3^2)$ 先算 -3^2 , 再算除法.

问题 3 略

新知生成 (1) 乘方 加减 (2) 左 右

(3) 括号内 中括号

实践应用

$$\text{解: } (1) -4^2 \times (-2) + [(-2)^3 - (-4)] = -16 \times (-2) + (-8 + 4) = 32 - 4 = 28.$$

$$(2) -1^{2\,025} - (-2)^3 - 2 \times (-3) = -1 - (-8) - (-6) = -1 + 8 + 6 = 13.$$

[即时测评]

$$\text{解: } (1) 16 \div (-2)^3 - \left(-\frac{1}{8}\right) \times (-4) + (-1)^{2\,026} = 16 \div (-8) - \frac{1}{2} + 1 = -2 - \frac{1}{2} + 1 = -\frac{3}{2}.$$

$$(2) -3^2 + 1 \div 4 \times \frac{1}{4} - \left|-1 \frac{1}{4}\right| \times (-0.5)^2 = -9 + \frac{1}{16} - \frac{5}{16} = -9 \frac{1}{4}.$$

任务二

例 解: (1) 第①行数按 $(-3)^1, (-3)^2, (-3)^3, (-3)^4, \dots, (-3)^n$ 排列.

(2) 第②行数是第①行相应的数分别乘 $-\frac{1}{3}$ 得到的, 即 $-\frac{1}{3} \times (-3)^n$; 第③行数比第①行相应的数分别大 1, 即 $(-3)^n + 1$.

$$(3) (-3)^7 + \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-3)^7 + (-3)^7 + 1 = (-3)^7 \times \left(1 - \frac{1}{3} + 1\right) + 1 = -3\,645 + 1 = -3\,644.$$

所以这三个数的和为 $-3\,644$.

[即时测评]

解: (1) 第①行数的规律是: 从第一个数开始, 后面的每一个数都是前面一个数乘 (-2) 得到的, 即 $2, 2 \times (-2), -4$

$\times (-2), 8 \times (-2), -16 \times (-2), 32 \times (-2), \dots$.

(2) 第②行每个位置上的数是第①行相应位置上的数减 3 得到的; 第③行每个位置上的数是第①行相应位置上的数除以 2 再加上 1 得到的.

$$(3) \text{ 第①行的第 8 个数为 } -64 \times (-2) \times (-2) = -256;$$

$$\text{第②行的第 8 个数为 } -256 - 3 = -259;$$

$$\text{第③行的第 8 个数为 } -256 \div 2 + 1 = -127;$$

$$\text{所以这三个数的和为 } -256 - 259 - 127 = -642.$$

【课堂小结】

乘方 乘除 加减

【当堂检测】

1. B 2. C 3. D 4. B

$$5. \text{ 解: } (1) -2^3 \div 8 - \frac{1}{4} \times (-2)^2 = -8 \div 8 - \frac{1}{4} \times 4 = -1 - 1 = -2.$$

$$(2) -3^2 + (-12) \times \left| -\frac{1}{2} \right| - 6 \div (-1) \\ = -9 + (-12) \times \frac{1}{2} + 6 = -9 - 6 + 6 = -9.$$

【课后评价】

1. D 2. C 3. D 4. D

5. 乘方 乘法 加减 12 6. C

$$7. -\frac{17}{81} \quad \text{解析: 由 } -1, \frac{3}{4}, -\frac{5}{9}, \frac{7}{16}, \dots, \text{ 可得奇数项为负数, 偶数项为正数, 分子为 } 2n-1, \text{ 分母为 } n^2. \\ \text{所以第 9 个数为 } -\frac{2 \times 9 - 1}{9^2} = -\frac{17}{81}.$$

$$\text{故答案为 } -\frac{17}{81}.$$

8. D 9. A 10. D

$$11. \text{ 解: } (1) \text{ 原式 } = -1 + |2 - 9| - \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = -1 + 7 - \frac{1}{3} = 5 \frac{2}{3}.$$

$$(2) \text{ 原式 } = -1 + \left(-\frac{27}{8}\right) \times \frac{4}{3} - \frac{1}{8} \\ = -1 + \left(-\frac{9}{2}\right) - \frac{1}{8} = -5 \frac{5}{8}.$$

$$(3) \text{ 原式 } = -1 - 0.5 \times \frac{1}{3} \times (2 - 9) \\ = -1 - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{1}{6}.$$

$$(4) \text{ 原式 } = -8 \times 1 - 12 \div \left(-\frac{1}{4}\right) = -8 - 12 \times (-4) = -8 + 48 = 40.$$

12. 解: (1) $2^1, -2^2, 2^3, -2^4, 2^5, -2^6, \dots$ (或 $(-1)^{n+1} \times 2^n$).

(2) 第①行的数等于第③行对应位置的数的一半. 第②行的数等于第③行对应位置的数减 2.

$$(3) -2^7 + (-2^8 - 2) + (-2^8) = -128 - 258 - 256 = -642.$$

$$13. \text{ 解: } (1) \frac{99}{100} \quad \frac{101}{100}$$

$$(2) \text{ 原式 } = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{2\,024}{2\,025} \times \frac{2\,026}{2\,025} \times \frac{2\,025}{2\,026} \times \frac{2\,027}{2\,026} \\ = \frac{1}{2} \times \frac{2\,027}{2\,026} = \frac{2\,027}{4\,052}.$$

第 3 课时 科学记数法、近似数

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: (1) 100 (2) 1 000 (3) 10 000

(4)100 000

追问: 10 的几次方, 1 的后面就有几个 0.

探究 2 解: 8.162×10^9 .

探究 3 9.597×10^6 2.8×10^{10}

新知生成 $a \times 10^n$

[即时测评]

解: (1) 0.32×10^7 不正确, 0.32 不符合科学记数法形式.

(2) 3.2×10^6 正确, 符合科学记数法形式.

(3) 28×10^5 不正确, 28 不符合科学记数法形式.

(4) 2.8×10^6 正确, 符合科学记数法形式.

任务二

例 1 解: $2\ 000\ 000 = 2 \times 10^6$;

$350\ 000\ 000 = 3.5 \times 10^8$;

$8\ 000\ 000\ 000 = 8 \times 10^9$.

例 2 解: (1) $6 \times 10^5 = 600\ 000$.

(2) $1.7 \times 10^7 = 17\ 000\ 000$.

[归纳总结] 少 1 $n-1$

[即时测评]

1. D 2. (1)110 000 (2)36 790 000

3. 解: $80\ 000 = 8 \times 10^4$, $56\ 000\ 000 = 5.6 \times 10^7$, $7\ 400\ 000 = 7.4 \times 10^6$.

任务三

探究 1 解: (1)24 是准确数.(2)2 万是近似数.(3)10 是准确数.(4)75 万是近似数.

探究 2 3.1 0.001 千分位

探究 3 2.37 2.4 不能

[即时测评]

解: (1) $1.025 \approx 1.03$.

(2) $1.025 \approx 1.0$.

(3) $1.025 \approx 1$.

【课堂小结】

$a \times 10^n$ 1 10 减 1

【当堂检测】

1. 5.146×10^9 2. 8×10^3

3. 解: (1) $0.876\ 45 \approx 0.88$.

(2) $2.398\ 4 \approx 2.40$.

(3) $52\ 141 \approx 5.2 \times 10^4$.

【课后评价】

1. B 2. C 3. B 4. B 5. 5.6×10^3 6. D 7. C

8. D 9. D 10. D 11. 3.14 12. 百万

13. 解: (1) 10^{10} 10^{m+n}

(2)① $(1.5 \times 10^4) \times (1.2 \times 10^5) = (1.5 \times 1.2) \times (10^4 \times 10^5) = 1.8 \times 10^9$.

② $(-6.4 \times 10^3) \times (2 \times 10^6) = (-6.4 \times 2) \times (10^3 \times 10^6) = -12.8 \times 10^9 = -1.28 \times 10^{10}$.

14. 解: (1) $0.632\ 8 \approx 0.63$.

(2) $7.912\ 2 \approx 8$.

(3) $130.96 \approx 131.0$.

(4) $46\ 021 \approx 4.60 \times 10^4$.

15. 解: 有这种可能. 因为 $1.6 \times 10^2 = 160$, 所以这个数精确到十位. 设身高是 x cm. 当 x 的取值范围是 $155 \leq x < 165$ 时, 近似取值后都为 160 cm. 若甲的身高为 164 cm, 乙的身高为 155 cm, 则甲比乙高 9 cm.

第三章 代数式

3.1 列代数式表示数量关系

第 1 课时 用字母表示数

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: $2h$ 行驶的路程是 $100 \times 2 = 200$ (km);

$3h$ 行驶的路程是 $100 \times 3 = 300$ (km);

$4h$ 行驶的路程是 $100 \times 4 = 400$ (km);

t h 行驶的路程是 $100t$ km.

探究 2 解: 字母 t 表示列车在冻土地段行驶的时间;

用 v 表示速度, 列车行驶的路程 $= vt$.

探究 3 解: 圆的面积 $= \pi r^2$ (r 为圆的半径). (答案不唯一)

新知生成 (2)运算符号 数或表示数的字母 数或字母

[即时测评]

解: (1)这个三角形的面积是 $\frac{3}{2}h$ m².

(2)第二季度的产量是 $(3x-20)$ 件.

(3)池内水的体积为 $\frac{1}{3}a^2b$ m³.

任务二

例 解: (1) ab 的意义是 a 与 b 的积.

(2) $2(a+3)$ 的意义是 a 与 3 的积的 2 倍.

(3) $\frac{s}{ab}$ 的意义是 s 除以 a, b 的积的商.

(4) $x^2+2xy+y^2$ 的意义是 x 的平方, x 与 y 的积的 2 倍, 以及 y 的平方的和.

[即时测评]

1. C

2. 解: 都不规范. 改正如下:

$xy, \frac{17}{6}ab, -n, 3x, \frac{m}{3}$.

【课堂小结】

运算符号 数或表示数的字母 ①乘号 ②数字

字母 ③省略 ④假分数 ⑤幂 ⑦分数

【当堂检测】

1. B 2. D 3. B 4. D

【课后评价】

1. C 2. C 3. D 4. B

5. a 的 3 倍与 2 的差

6. 某种糖果每千克 x 元, 购买这种糖果 5 kg, 则 $5x$ 表示购买 5 kg 糖果的总价 (答案不唯一)

7. C 8. B

9. B 解析: A. 整条线段的长度为 $a+8$, 不符合题意;

B. 长方形的周长为 $2a+6$, 正确, 符合题意;

C. 图形的面积为 $8a$, 不符合题意;

D. 长方形的周长为 $2a+12$, 不符合题意.

10. B 解析: B. 若一个两位数的十位数字是 4, 个位数字是 a , 则 $40+a$ 表示这个两位数, 选项中说法不正确, 故符合题意.

11. D 12. $\frac{S}{ab}$

13. 解: (1) a 表示正方形的边长.

(2) a 表示毛巾的数量.

(3) x 表示男生的人数.

14. 解: (1)例如, 练习本每本 0.8 元, 小明买了 a 本, 共付款 $0.8a$ 元. (答案不唯一)

(2)例如, 一支钢笔 x 元, 一支铅笔 y 元, 小红买了 6 支钢笔和 3 支铅笔, 共付的钱数. (答案不唯一)

第 2 课时 列代数式表示数量关系

【课堂导学】

任务一

问题 1 (1) $a^2(b-c)$ (2) $2(a+1)+b$ (3) a^2+b^2

(4) $(a+b)^2$

问题 2 (1) a^2 (2) vt (3) (a^2-b^2)

[即时测评]

解: (1) $(2a+3b)$ 元.

(2) $0.8mn$ 元.

(3) $(1.1x-10)$ 元.

任务二

例 解: (1) 7 10 22

(2) 搭 100 个这样的正方形需要 $1+3 \times 100=301$ (根) 火柴.

(3) $(3x+1)$ 根.

(4) 601 6 082

[即时测评]

$(9+2n)$ 解析: 由题意, 得相当于在 9 cm 的基础上每个杯子增加了 2 cm, 所以 n 个杯子叠在一起的高度是 $(9+2n)$ cm.

故答案为 $(9+2n)$.

【当堂检测】

1. $30n$

2. 解: 顺水行驶和逆水行驶时的速度分别是 $(v+2.5)$ km/h, $(v-2.5)$ km/h.

3. 解: 三角尺的面积为 $\left(\frac{1}{2}ab - \pi r^2\right) \text{cm}^2$.

4. 7 12 17 22 $5n+2$

【课后评价】

1. D 2. B 3. A 4. A

5. B 解析: 由所给图形可知,

第①个图形中黑棋的颗数为 $3=1 \times 2+1$;

第②个图形中黑棋的颗数为 $5=2 \times 2+1$;

第③个图形中黑棋的颗数为 $7=3 \times 2+1$;

.....

所以第 n 个图形中黑棋的颗数为 $2n+1$.

当 $n=9$ 时, $2n+1=19$,

即第⑨个图形中有 19 颗黑棋.

6. D 7. B 8. D

9. C 解析: 因为十位数字是 x , 个位数字是 y , 所以交换后的数个位数字是 x , 十位数字是 y , 所以得到的数为 $10y+x$.

10. $\frac{a-30}{6}$

11. 解: 因为第 1 个图形棋子个数为 $1 \times 4=4$;

第 2 个图形棋子个数为 $2 \times 4=8$;

第 3 个图形棋子个数为 $3 \times 4=12$;

.....

所以摆第 n 个图形需要 $4n$ 个棋子.

12. 解: (1) 比 a 的 3 倍小 4 的数可表示为 $3a-4$.

(2) a 的一半与 b 的和平方可表示为 $\left(\frac{1}{2}a+b\right)^2$.

(3) 近防炮 t min 能发射 $10\,000t$ 发炮弹.

(4) 购买 n 件单价为 c 元的商品要花的金额为 cn 元, 应找回的金额为 $(1\,000-cn)$ 元.

13. 解: (1) 0.5 85

(2) 因为 x 本课本的高度为 $0.5x$ cm, 讲台的高度为 85 cm,

所以这一摞课本的顶部距离地面的高度为 $(85+0.5x)$ cm.

(3) 当 $x=42$ 时, $85+0.5x=106$.

答: 这摞课本的顶部距离地面的高度为 106 cm.

第 3 课时 探究反比例关系

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: 填表如下.

长/cm	40	30	25	20	15	...
宽/cm	3	4	4.8	6	8	...

探究 2 解: 长方形的长增加, 宽减少; 长减少, 宽增加. 长和宽的乘积不变.

探究 3 解: (1) $ab=120$ (2) $S=ab$.

新知生成 随着变化 乘积

[即时测评]

解: (1) 成反比例关系. 理由如下:

因为“总钱数=练习本单价 $\times$ 练习本数量”, 总钱数一定.

(2) 成反比例关系. 理由如下:

因为“路程=平均速度 $\times$ 行驶时间”, 路程一定.

(3) 不成反比例关系. 理由如下:

因为“单价=总费用 $\div$ 数量”.

任务二

例 (1) 12 000 (2) $at=12\,000$ 反比例

[即时测评]

(1) 20 20 15

(2) 每小时加工个数 加工时间 减少

(3) 600 加工零件的总个数

(4) 加工零件的总个数 每小时加工个数 加工时间 反比例

【课堂小结】

两个 乘积 两 定值

【当堂检测】

1. ①② 2. 16

【课后评价】

1. B 2. B 3. A 4. B 5. C 6. C 7. B

8. D 解析: 设甲、乙两个量对应的数分别是 x 和 y .

因为甲、乙是两个成反比例的量,

所以 $xy=k$ (定值).

当甲增加 50% 时, 甲变成了 $(1+50\%)x=\frac{3}{2}x$,

所以乙变成了 $\frac{2}{3}y$.

因为 $\left(y-\frac{2}{3}y\right) \div y = \frac{1}{3}$, 所以乙一定会减少 $\frac{1}{3}$.

9. C

10. 解: (1) 3 12

(2) 这组长方形的长与宽成反比例关系. 理由如下:

设长方形的长为 x , 宽为 y , 根据表格中的数据可知, 无论长和宽如何变化, 都有 $xy=48$, 即这组长方形的长与宽的乘积一定,

所以这组长方形的长与宽成反比例关系.

11. 解: (1) 12 4 12 12 12 12

(2) 反比例关系. 因为刻度数和砝码数的乘积为定值, 所以刻度数和砝码数成反比例关系.

12. 解: (1) 600

(2) $n=\frac{300\,000}{m}$, n 与 m 成反比例关系.

(3) $\frac{300\,000}{150}=2\,000$ (mL).

答: 每瓶的容量是 2 000 mL.

3.2 代数式的值

第 1 课时 代数式的值

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: 需要购置的足球总数是 $(4n+30)$ 个.

探究 2 解: 需要购置的足球总数是 $4 \times 24+30=126$ (个).

探究 3 解: 需要购置的足球总数是 $4 \times 30+30=150$ (个).

探究 4 解: 需要购置的足球数量随班级数量变化而变化, 当班级的数量确定时, 需要购置的足球数量也随之确定.

新知生成 字母 结果 不同

[即时测评]

-10 2 4 11

任务二

例 1 解: (1) 当 $x=5$, $y=7$ 时,

$2x+3y=2 \times 5+3 \times 7=31$.

(2)当 $x=-1, y=6$ 时,
 $2x+3y=2\times(-1)+3\times6=16$.

例 2 解: (1)当 $a=3, b=6$ 时,

$$a^2 - \frac{b}{a} = 3^2 - \frac{6}{3} = 7.$$

(2)当 $a=-3, b=5$ 时,

$$a^2 - \frac{b}{a} = (-3)^2 - \frac{5}{-3} = \frac{32}{3}.$$

[归纳总结] (1)不变 (2)乘号 (3)括号

[即时测评]

1. (1)3 (2) $\frac{3}{4}$

2. $-6 \quad 30 \quad -216 \quad -\frac{2}{3} \quad -\frac{3}{2}$

【课堂小结】

直接 整体

【当堂检测】

1. A 2. D 3. A 4. 2π 3

【课后评价】

1. A 2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. A 8. A

9. D 10. C

11. C **解析:** 因为第 1 个图案中“”的个数为 $1\times3+1=4$;

第 2 个图案中“”的个数为 $2\times3+1=7$;

第 3 个图案中“”的个数为 $3\times3+1=10$;

.....

第 2 026 个图案中“”的个数为 $3\times2\ 026+1=6\ 079$.

12. C **解析:** 根据图中的运算程序进行计算,得
 输入 $x=-1$ 时,因为 -1 是奇数,所以输出 $-1-5=-6$.

输入 $x=-6$ 时,因为 -6 是偶数,所以输出 $-6\times\frac{1}{2}=-3$.

输入 $x=-3$ 时,因为 -3 是奇数,所以输出 $-3-5=-8$.

输入 $x=-8$ 时,因为 -8 是偶数,所以输出 $-8\times\frac{1}{2}=-4$.

输入 $x=-4$ 时,因为 -4 是偶数,所以输出 $-4\times\frac{1}{2}=-2$.

输入 $x=-2$ 时,因为 -2 是偶数,所以输出 $-2\times\frac{1}{2}=-1$.

输入 $x=-1$ 时,因为 -1 是奇数,所以输出 $-1-5=-6$.

输入 $x=-6$ 时,因为 -6 是偶数,所以输出 $-6\times\frac{1}{2}=-3$.

.....

以此类推,得输出分别以 $-6, -3, -8, -4, -2, -1$ 循环.

$2\ 026\div6=337\cdots4$,

故第 2 026 次输出的结果是一4.

13. 1

14. **解:** (1)当 $x=2, y=-3$ 时,

$$x^2+2xy+y^2=2^2+2\times2\times(-3)+(-3)^2=1.$$

(2)当 $x=\frac{1}{2}, y=-4$ 时,

$$x^2+2xy+y^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2+2\times\frac{1}{2}\times(-4)+(-4)^2=\frac{49}{4}.$$

15. **解:** (1)($1\ 200x+8\ 000$) ($960x+11\ 200$)

(2)当 $x=10$ 时,

若该客户按方案一购买,需付款 $1\ 200\times10+8\ 000=20\ 000$ (元).

若该客户按方案二购买,需付款 $960\times10+11\ 200=20\ 800$ (元).

因为 $20\ 000<20\ 800$,

所以按方案一购买较为合算.

第 2 课时 代数式的值的应用

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: (1)由题图可知长方形的面积为 $20x\text{ m}^2$.

因为半圆的半径为 $\frac{1}{2}\times20=10$ (m),

所以半圆的面积为 $\pi\times10^2\div2=50\pi$ (m^2).

所以阴影部分的面积为 $(20x-50\pi)\text{ m}^2$.

探究 2 解: 当 $x=30, \pi$ 取 3 时,

$$20x-50\pi=20\times30-50\times3=600-150=450(\text{m}^2).$$

所以阴影部分的面积为 450 m^2 .

[归纳总结] $s=vt$

[即时测评]

(1) $\pi r^2 \quad 2\pi r$ (2) $\frac{1}{2}ah$

任务二

例 解: (1) $Q=4m+10n$.

(2)将 $m=5\times10^4, n=3\times10^3$ 代入 $Q=4m+10n$, 得 $Q=4\times5\times10^4+10\times3\times10^3=2.3\times10^5$.

[即时测评]

解: (1) $2x \quad [2.6(x-20)+40]$

$$(2)15\times2+17\times2+[2.6\times(21-20)+40]$$

$$=30+34+42.6=106.6(\text{元}).$$

答:小花家这个季度共缴纳水费 106.6 元.

【课堂小结】

建模

【当堂检测】

1. (1) $ab \quad 6$ (2) $\frac{(a+b)h}{2} \quad 15$

2. **解:** (1) $V=ab^2$.

(2)当 $a=60\text{ cm}, b=40\text{ cm}$ 时,

$$V=ab^2=60\times40^2=96\ 000(\text{cm}^3).$$

答:这个纸箱的体积为 $96\ 000\text{ cm}^3$.

【课后评价】

1. $2(a+b) \quad ab \quad 10 \quad 6$

2. $24-\frac{9}{2}\pi$ **解析:** 设 $AB=a, AD=b$, 则图中阴影部分

的面积为 $ab-\frac{\pi a^2}{2}$. 当 $a=3, b=8$ 时, 图中阴影部分的

$$\text{面积为 } 3\times8-\frac{9\pi}{2}=24-\frac{9\pi}{2}.$$

$$\text{故答案为 } 24-\frac{9}{2}\pi.$$

3. D

4. **解:** (1)这套新房的面积为 $(a^2+2a+4b)\text{ m}^2$.

(2)当 $a=5, b=6$ 时,

$$a^2+2a+4b$$

$$=5^2+2\times5+4\times6$$

$$=25+10+24$$

$$=59(\text{m}^2).$$

所以这套新房铺地板砖所需的总费用为 $59\times90=5\ 310$ (元).

5. A

6. **解:** (1)2

(2)①由(1)得, 相邻两个杯子杯口之间的高度差为 2 cm ,

所以一个杯子的高度为 $10-2=8(\text{cm})$.

所以 x 个杯子按如图所示方式整齐叠放在桌面上, 这些杯子的顶部距离桌面的高度是 $8+2(x-1)=(2x+6)\text{cm}$.

②当 $x=12$ 时, 这些杯子的顶部距离桌面的高度是 $2\times 12+6=30(\text{cm})$.

7. 解: (1) 需要硬化部分的面积为 $(3a+b)(2a+b)-(a+b)^2-\pi(a-b)^2$.

(2) 当 $a=30, b=10$ 时,

硬化部分的面积为 $(90+10)\times(60+10)-40^2-\pi\times 20^2=(5\,400-400\pi)\text{m}^2$.

8. 解: (1) 在甲店购买需付款 $48\times 5+(x-5)\times 12=(12x+180)$ 元;

在乙店购买需付款 $48\times 90\%\times 5+12\times 90\%x=(10.8x+216)$ 元.

(2) 当 $x=40$ 时,

甲店需 $12\times 40+180=660(\text{元})$,

乙店需 $10.8\times 40+216=648(\text{元})$,

所以去乙店购买较为合算.

(3) 先在甲店购买 5 副球拍, 送 5 盒乒乓球, 花费 240 元, 另外 35 盒乒乓球在乙店购买, 需花费 378 元, 共需花费 618 元.

第四章 整式的加减

4.1 整式

第 1 课时 单项式

【课堂导学】

任务一

(1) $0.8p$ (2) mn (3) a^2h (4) $-n$

问题探究 解: 都是数或字母的积的形式.

新知生成 数或字母的积 单项式 一个数 一个字母

【即时测评】

解: (2)(5)(6)(7) 是单项式.

任务二

问题 1 (1) 数字因数 (2) 所有字母的指数的和 0 0

问题 2 单项式系数和次数如下表所示.

单项式	$-6a^2$	a^3	v	$-n$	$2\pi r$	$\frac{x}{4}$	-3^2x^2y	5
系数	-6	1	1	-1	2π	$\frac{1}{4}$	-9	5
次数	2	3	1	1	1	1	3	0

【即时测评】

解: (1) $6a^2\text{cm}^2$, 是单项式, 系数是 6, 次数是 2.

(2) $0.8a$ 元, 是单项式, 系数是 0.8, 次数是 1.

(3) $vt\text{ km}$, 是单项式, 系数是 1, 次数是 2.

(4) $\frac{1}{2}b\text{ m}^2$, 是单项式, 系数是 $\frac{1}{2}$, 次数是 1.

任务三

(1) ab (2) ab (3) ab

探究 1 解: 代数式 ab 可以表示生活中不同的情境.

探究 2 解: 七年级(1)班共有 a 名同学, 期中考试数学平均分为 b 分, 则七年级(1)班的数学总分是多少分? (答案不唯一)

【即时测评】

解: $-xy^3, -x^2y^2, -x^3y$.

【课堂小结】

数 字母 字母 和

【当堂检测】

1. D 2. D 3. 2 4. $1.2x$

【课后评价】

1. B 2. C 3. D 4. D 5. $\frac{3\pi}{2}$ 4

6. 解: 各单项式的系数和次数如表.

	$30a$	$-x^3$	y	ab^2c^3	$-\frac{3xy^3}{4}$	πr^2
系数	30	-1	1	1	$-\frac{3}{4}$	π
次数	1	3	1	6	4	2

7. D 8. C 9. $2x^2y$ (或 $2xy^2$) 10. B 11. 0

12. 解: (1) ①③④⑤⑥⑦⑧ ③④⑦⑧

(2) ⑦ 5

13. 解: (1) 由题意可知这周的销售额为 $0.9ab$ 万元, 系数为 0.9, 次数为 2.

(2) $t\text{ min}$ 所走的路程是 $vt\text{ m}$, 系数为 1, 次数为 2.

(3) 液体的体积是 πr^2h , 系数为 π , 次数为 3.

14. 解: (1) $(-1)^n$ (或负号、正号依次交替出现)

$2n-1$ (或从 1 开始的连续奇数)

(2) 从 1 开始的连续自然数

(3) $(-1)^n(2n-1)x^n$ (n 为正整数)

(4) $-4\,049x^{2\,025}-4\,051x^{2\,026}$

第 2 课时 多项式及整式

【课堂导学】

任务一

(1) $(t-5)$ (2) $(3x+5y+2z)$ (3) $(x^2+4x+72)$

问题探究 解: 这些式子除了含有乘法运算外, 还含有加减运算, 都可以看成几个单项式的和.

新知生成 (1) 单项式 和 项 (2) 单项式 多项式

【即时测评】

B

任务二

回顾复习 (1) -5 1 (2) $-\frac{3}{2}$ 2 (3) 2

类比探究 (1) $2ab+2ac+2bc$ (2) a^2-b^2

(3) $3a-m^2$ (4) $100z+10y+x$ 指出项和次数略.

新知生成 次数最高

【即时测评】

1. B 2. x^2 y $-z$ 二 三

3. 解: $3a^2b^3, -a^4, b$.

任务三

例 解: (1) ③⑤⑦ ①②

(2) $a^2b+ab-b^2-\frac{xy^2}{3}+2$. (答案不唯一)

【即时测评】

解: 单项式: $a^4b^2, 0, m, ab^2c, \frac{x^3}{\pi}$.

多项式: $10x+y, 3a^2b^3-a^4+b, x^7y+2$.

【课堂小结】

数字因数 指数的和 每个单项式 最高

【当堂检测】

1. A 2. C

3. 解: 因为 $-\frac{5}{6}x^2y^{m+2}+xy^2-\frac{1}{2}x^3+6$ 是六次四项式,

所以 $2+m+2=6$.

所以 $m=2$.

因为单项式 $\frac{2}{3}x^{3n}y^{4-m}z$ 的次数与这个多项式的次数

相同,

所以 $3n+4-m+1=6$.

所以 $3n=3$.

所以 $n=1$.

【课后评价】

1. A 2. B 3. C 4. 六 四 5. C 6. C

7. $2m+2n$ 8. -5 9. -3 10. D 11. B

12. x^2y (答案不唯一)

13. 解: 整式集合: $\frac{x+y+z}{3}, 4xy, \frac{m^2n}{2}, 0, m, -2.01 \times 10^5$;

单项式集合: $4xy, \frac{m^2n}{2}, 0, m, -2.01 \times 10^5$;

多项式集合: $\frac{x+y+z}{3}$.

14. 解: (1) 因为成人票每张 10 元, 成人有 x 人, 学生票每张 5 元, 学生有 y 人, 所以该旅游团应付门票费为 $(10x+5y)$ 元.

(2) 当 $x=30, y=15$ 时,

$$10x+5y=10 \times 30+5 \times 15=375.$$

答: 他们应付 375 元门票费.

15. 解: (1) $x^3+3x^2y-4xy^2-5y^3$.

(2) $-x+x^4+1$ 补入缺项后为 $-x+x^4+1+0 \cdot x^3+0 \cdot x^2$,

降幂排列为 $x^4+0 \cdot x^3+0 \cdot x^2-x+1$.

4.2 整式的加法与减法

第 1 课时 合并同类项

【课堂导学】

任务一

探究 1 $(133-33) \times 3$ 300 $(20-33) \times \frac{3}{2}$

$-\frac{39}{2}$ $(50-15) \times 2$ 70 $(14-8)t$ $6t$ 道理略

探究 2

(1) $(14+8)t$ $22t$

(2) $(3+1)x^2$ $4x^2$

(3) $(9+6)ab$ $15ab$

(4) $(-5+1)x^2y$ $-4x^2y$

探究 3 解: $3a+8b$ 不可以合并, 因为两项中不含相同字母. 再写出一个不能合并的多项式为 $4x+10y$. (答案不唯一)

探究 4 解: 在多项式 $3x^2-5xy+x^2+x^2y$ 中, $3x^2$ 和 x^2 两项可以合并成一项, 它们所含字母相同, 相同字母的指数也相同.

新知生成 (1) 字母 字母 指数 同类项

(2) 同类项

[即时测评]

解: (1) 是, (2)(3) 不是. 理由略.

任务二

例 1 (1) $5x^2$ (2) $-7x^2y$ (3) $7mn$ (4) 0

[归纳总结] 系数 不变

[即时测评]

1. (1) $\times$ (2) $\times$ (3) $\times$

2. (1) $4x^3$ (2) $-4xy^2$ (3) $6x^2y+x-10$

任务三

例 2 解: 原式 $= -2x-2$.

将 $x=\frac{1}{2}$ 代入, 得原式 $= -3$.

例 3 解: $3a+3a-b+3a-b-b=(9a-3b)$ 名.

故两年后小明所在的学校一共有 $(9a-3b)$ 名学生.

[即时测评]

解: 原式 $= -6m-mnp$. 将 $m=\frac{1}{2}, n=5, p=-3$ 代入,

得原式 $= -3+\frac{15}{2}=\frac{9}{2}$.

【课堂小结】

① 字母相同 ② 相同字母的指数也相同 和 指数

【当堂检测】

1. A

2. (1) $x-3y$ (2) x^2-4y^2

3. 解: 原式 $= a^3-b^3$. 将 $a=\frac{1}{4}, b=-\frac{1}{2}$ 代入, 得

$$\text{原式} = \frac{1}{64} + \frac{1}{8} = \frac{9}{64}.$$

【课后评价】

1. A 2. B 3. $-a^2$ $3a$ -2

4. C 解析: 两个同类项中相同字母的指数相同, 所以 $2n-1=m, m=3$, 解得 $m=3, n=2$.

5. B 6. 四

7. 解: (1) $a^2-2ab+b^2+a^2+2ab+b^2$

$$= (a^2+a^2) + (-2ab+2ab) + (b^2+b^2)$$

$$= 2a^2+2b^2.$$

$$(2) \frac{1}{5}x^2-4x+\frac{x^2}{3}-6x^2+3-\frac{x}{3}-1$$

$$= \left(\frac{1}{5}x^2+\frac{x^2}{3}-6x^2\right) + \left(-4x-\frac{x}{3}\right) + (3-1)$$

$$= -\frac{82}{15}x^2-\frac{13}{3}x+2.$$

8. B

9. 五 $-xy^4$ $-xy^4-y^3+5xy^2+7x^2y-1$

10. D 11. 0

12. $-\frac{4}{9}$ 解析: $5a^2-5a+4-3a^2+6a-5=2a^2+a-1$,

当 $a=\frac{1}{3}$ 时, 原式 $= 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{2}{9} + \frac{1}{3} - 1$

$$= -\frac{4}{9}.$$

13. -4

14. 解: 根据同类项的定义, 得 $x=2, y=3$.

所以当 $x=2, y=3$ 时,

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \times 2^3 - \frac{1}{6} \times 2 \times 3^2 + \frac{1}{3} \times 3^3$$

$$= 4-3+9$$

$$= 10.$$

15. 解: (1) $2x^3+3x^2y-xy^2-3x^2y+xy^2+y^3$

$$= (3x^2y-3x^2y) + (-xy^2+xy^2) + 2x^3+y^3$$

$$= 0+0+2x^3+y^3$$

$$= 2x^3+y^3.$$

当 $x=1, y=-2$ 时, 原式 $= 2 \times 1^3 + (-2)^3 = 2-8 = -6$.

$$(2) 0.2x^2y-0.5xy^2-0.3x^2y+0.7x^2y$$

$$= (0.2x^2y-0.3x^2y+0.7x^2y)-0.5xy^2$$

$$= 0.6x^2y-0.5xy^2.$$

当 $x=-1, y=\frac{2}{3}$ 时,

$$\text{原式} = 0.6 \times (-1)^2 \times \frac{2}{3} - 0.5 \times (-1) \times \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$= \frac{2}{5} + \frac{2}{9}$$

$$= \frac{28}{45}.$$

16. 解: $3a \cdot 4b - \frac{1}{2} \times 2a \cdot 4b - \frac{1}{2} \times 2a \cdot b$

$$= 12ab-4ab-ab=7ab,$$

所以阴影部分的面积为 $7ab$.

第2课时 去括号

【课堂导学】

任务一

探究1 解:有4种方法: $x+x+(2x+1)$, $5+4(x-1)$, $5x-(x-1)$, $4x+1$.结果都相等.理由略.

探究2 ① $a+b+c$ ② $a-b-c$ ③ $a+b-c$ ④ $a-b+c$ ①③ ②④

[归纳总结] 乘 每一项

[即时测评]

(1) $2-x$ $8-4x$ (2) $-5+2x$ $-6x-18$

任务二

例1 解:(1) $ab+2b^2-(5ab-b^2)=ab+2b^2-5ab+b^2=-4ab+3b^2$.

(2) $(5a-3b)-3(a-2b)=5a-3b-3a+6b=2a+3b$.

[归纳总结] (1)分配律 (2)每一项 (3)有几项

[即时测评]

解:(1)原式 $=3a-2b+4a-c-3b=7a-5b-c$.

(2)原式 $=6y^2-2x^2+y+2x^2-6y^2=y$.

任务三

例2 解: $4(a+20)-3(a-20)$

$=4a+80-3a+60$

$=(a+140)\text{km}$.

答:飞机顺风飞行4 h比逆风飞行3 h多飞 $(a+140)\text{km}$.

[即时测评]

$6a^2b-2$

【课堂小结】

乘 每一项 相加 分配律 每一项

【当堂检测】

1. D 2. B

3. (1)× 改: $3(x+8)=3x+24$.

(2)× 改: $-3(x-8)=-3x+24$.

(3)× 改: $4(-3-2x)=-12-8x$.

(4)✓

4. (1) $-a^2-8$ (2) $-\frac{1}{2}m-\frac{13}{2}$

【课后评价】

1. C 2. D 3. B 4. A 5. $5x-7$

6. 解:(1) $2a^2-(a^2+2)=2a^2-a^2-2=a^2-2$.

(2) $8a+2b+2(5a-b)=8a+2b+10a-2b=18a$.

7. D 8. D 9. $(5x+50)$ 10. $-2x^2+xy-\frac{5}{2}y^2$

11. B 12. C 13. 1

14. 解:(1)一 去括号时,最后一项没有变号

(2)乘法对加法的分配律

(3) $(a^2b+4ab)-3(ab-a^2b)$

$=a^2b+4ab-3ab+3a^2b$

$=4a^2b+ab$.

15. 解:[知识总结]小于

[知识反思]当 $a-b>0$ 时, $a>b$;当 $a-b<0$ 时, $a<b$;当 $a-b=0$ 时, $a=b$.

[知识应用] $M-N=(x^2-6x+25)-(-6x+10)$

$=x^2-6x+25+6x-10$

$=x^2+15$.

因为 $x^2\geq 0$,所以 $x^2+15>0$,即 $M-N>0$.

所以 $M>N$.

第3课时 整式的加减

【课堂导学】

任务一

数学活动 $10a+b$ $10b+a$ $(10a+b)$ $(10b+a)$ $11a+11b$ 11

问题1 解:涉及整式的加法运算,先去括号,再合并同类项.

问题2 解:(1) $2x-3y+(5x+4y)=2x-3y+5x+4y=7x+y$.

(2) $(8a-7b)-(4a-5b)=8a-7b-4a+5b=4a-2b$.

[归纳总结] 去括号 合并同类项

[即时测评]

解:(1) $5x^2y-2x^2y+2xy^2-4xy^2=3x^2y-2xy^2$.

(2) $(3x^2-xy+1)-(4x^2+6xy-7)=3x^2-xy+1-4x^2-6xy+7=-x^2-7xy+8$.

任务二

探究1 解: $(3m+2n)-n+2(m+3n)=3m+2n-n+2m+6n=(5m+7n)m$.

答:护栏的总长度为 $(5m+7n)m$.

探究2 解:当 $m=6$, $n=2$ 时,

$(5m+7n)\times 70=(5\times 6+7\times 2)\times 70=3\ 080(\text{元})$.

答:建此停车场所需的费用为3 080元.

[即时测评]

解:(1)因为雄鹰队有 $(4a+5b)$ 人,蓝天队比雄鹰队少 a 人,

所以 $4a+5b-a=(3a+5b)$ 人.

所以蓝天队有 $(3a+5b)$ 人.

因为蓝豹队比蓝天队人数的2倍少 $(5a-b)$ 人,

所以 $2(3a+5b)-(5a-b)$

$=6a+10b-5a+b$

$=(a+11b)$ 人.

所以蓝豹队有 $(a+11b)$ 人.

答:蓝天救援队有 $(3a+5b)$ 人,蓝豹救援队有 $(a+11b)$ 人.

(2) $(4a+5b)+(3a+5b)+(a+11b)$

$=4a+5b+3a+5b+a+11b$

$=(4a+3a+a)+(5b+5b+11b)$

$=(8a+21b)$ 人.

答:三支救援队一共有 $(8a+21b)$ 人.

任务三

例 解:原式 $=\frac{1}{2}a-2a+\frac{2}{3}b^2-\frac{3}{2}a+\frac{1}{3}b^2=-3a+b^2$,

当 $a=-2$, $b=\frac{1}{3}$ 时,原式 $=-3\times(-2)+\left(\frac{1}{3}\right)^2=6+\frac{1}{9}=6\frac{1}{9}$.

[即时测评]

解:(1)因为 $M=a^2+4ab-3$, $N=a^2-6ab+9$,

所以 $2M-N=2(a^2+4ab-3)-(a^2-6ab+9)$

$=2a^2+8ab-6-a^2+6ab-9=a^2+14ab-15$.

(2)因为 $|a+2|+(b-1)^2=0$,且 $|a+2|\geq 0$, $(b-1)^2\geq 0$,

所以 $a+2=0$, $b-1=0$.

所以 $a=-2$, $b=1$.

所以 $2M-N=a^2+14ab-15=(-2)^2+14\times(-2)\times 1-15=-39$.

[归纳总结] (1)化简

【课堂小结】

②合并同类项 化简 求值

【当堂检测】

1. C

2. 解:(1)原式 $=2x^2+4x^2-12x-4-5x^2+12x-3=x^2-7$.

(2)原式 $=2a^2b-6ab^2-6a^2b+21ab^2=-4a^2b+15ab^2$.

3. 解: $4x^2y-[6xy-3(4xy-2)-x^2y]+1=4x^2y-(6xy-12xy+6-x^2y)+1=4x^2y-6xy+12xy-6+x^2y+1=5x^2y+6xy-5$.

当 $x=-1$, $y=2$ 时,

$$\text{原式} = 5 \times (-1)^2 \times 2 + 6 \times (-1) \times 2 - 5 = 10 + (-12) - 5 = -7.$$

$$\begin{aligned} 4. \text{解: } S_{\text{阴影}} &= S_{\text{梯形} FECD} + S_{\triangle BCD} - S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}(a+2) \times 2 + \\ &\frac{1}{2} \times a \times a - \frac{1}{2}(a+2) \times 2 = \frac{1}{2}a^2. \end{aligned}$$

【课后评价】

1. A 2. C 3. D 4. A 5. B

$$6. x+3y \quad 7. -21 \quad 8. \frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned} 9. \text{解: 原式} &= \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 4x + 6 - 5x = \\ &x^2 - x + 6, \end{aligned}$$

$$\text{当 } x = -1 \text{ 时, 原式} = (-1)^2 - (-1) + 6 = 8.$$

10. D 11. A 12. C

$$\begin{aligned} 13. \text{解: } (1) 2a+7b-5a-b &= (2a-5a) + (7b-b) \\ &= -3a+6b. \\ (2) (a^2-2a)-2(a^2-3a+1)+2 &= a^2-2a-2a^2+6a \\ &-2+2 = (a^2-2a^2) + (-2a+6a) -2+2 = -a^2+4a. \\ (3) 3(3x^2y-2xy^2)-4(-xy^2+2x^2y) &= 9x^2y-6xy^2+4xy^2-8x^2y \\ &= (9x^2y-8x^2y) + (-6xy^2+4xy^2) \\ &= x^2y-2xy^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14. \text{解: 因为 } A+B &= 9x^2-2x+7, B=x^2+3x-2, \\ \text{所以 } A &= 9x^2-2x+7-(x^2+3x-2) = 9x^2-2x+7-x^2-3x+2 = 8x^2-5x+9. \\ \text{所以 } A-B &= 8x^2-5x+9-(x^2+3x-2) \\ &= 8x^2-5x+9-x^2-3x+2 = 7x^2-8x+11. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15. \text{解: } (1) \text{①③} \\ (2) \text{满足条件的单项式为 } m^3n^3. &(\text{答案不唯一}) \\ (3) \text{因为 } A &= 3a^2+6b^2, B=a^2-2ab, \\ \text{所以 } A+3B &= 3a^2+6b^2+3(a^2-2ab) \\ &= 3a^2+6b^2+3a^2-6ab \\ &= 6a^2+6b^2-6ab, \text{ 是对称式.} \end{aligned}$$

综合素养评价(一)


1. A 2. C 3. A 4. D 5. A 6. A 7. D 8. D

9. D 10. A 11. < 12. 3 或 -5 13. 4

$$14. 12 \quad 15. -\frac{10}{101} \quad 16. 31$$

$$\begin{aligned} 17. \text{解: } (1) \text{原式} &= 1 \frac{3}{4} - 7.5 + 2 \frac{3}{8} - 1 \frac{3}{4} + 3 \frac{5}{8} \\ &= -7.5 + 6 \\ &= -1.5. \\ (2) \text{原式} &= (-8) + (-2) \times 11 - 36 \div (-2) \\ &= -30 + 18 \\ &= -12. \end{aligned}$$

18. 解: (1) 在数轴上表示如图:



$$\text{所以 } -4 < -1.5 < -(-2) < 3 \frac{1}{2} < |-8|.$$

$$(2) \text{由数轴可知, } a-c > 0, a-b < 0, b-c > 0, 2a < 0, \\ \text{所以原式} = a-c-(b-a)-(b-c)-2a = -2b.$$

$$\begin{aligned} 19. \text{解: } (1) \text{因为 } AB &= 3 \text{ cm}, BC=2AB, \\ \text{所以 } BC &= 6 \text{ cm}. \\ \text{所以 } AC &= AB+BC = 3+6 = 9(\text{cm}). \\ \text{故答案为 } 6; 9. \\ (2) \text{因为 } AD &\text{ 比 } DC \text{ 短 } 1 \text{ cm}, \\ \text{设 } DC &= x \text{ cm}, \text{ 则 } AD = (x-1) \text{ cm}, \\ \text{所以 } x &+ (x-1) = 9, \end{aligned}$$

$$\text{解得 } x = 5.$$

$$\text{所以 } DC = 5 \text{ cm}, AD = 4 \text{ cm}.$$

$$\text{因为 } E \text{ 是 } BC \text{ 的中点}, BC = 6 \text{ cm},$$

$$\text{所以 } EC = \frac{1}{2}BC = 3 \text{ cm}.$$

$$\text{所以 } DE = DC - EC = 5 - 3 = 2(\text{cm}).$$

$$20. \text{解: } (1) 15 - (-16) = 31.$$

故答案为 31.

(2) 这一周自行车厂完成了生产计划量.理由如下:

$$-16+10-5+12-8+15-4=4>0,$$

故这一周自行车厂完成了生产计划量.

$$(3) (80 \times 7 + 4) \times 3 = 1\,692(\text{kg}).$$

答: 这一周实际生产的共享单车投入使用后能帮助减排二氧化碳 1 692 kg.

$$21. \text{解: } (1) \text{因为 } A = 2a^2 + 3ab - 2a - 1, B = -a^2 + 12ab + 2,$$

$$\begin{aligned} \text{所以原式} &= 4A - 3A + 2B = A + 2B \\ &= 2a^2 + 3ab - 2a - 1 + 2(-a^2 + 12ab + 2) \\ &= 2a^2 + 3ab - 2a - 1 - 2a^2 + 24ab + 4 \\ &= 27ab - 2a + 3. \end{aligned}$$

$$(2) \text{原式} = (27b-2)a + 3,$$

由结果与 a 的取值无关, 得 $27b-2=0$,

$$\text{解得 } b = \frac{2}{27}.$$

$$22. \text{解: } (1) \text{用含 } x, y \text{ 的代数式表示输出的结果为 } \frac{1}{2}(x^2 + 3y).$$

$$(2) \text{当 } x = -2, y = -6 \text{ 时},$$

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \times [(-2)^2 + 3 \times (-6)]$$

$$= \frac{1}{2} \times (4 - 18)$$

$$= \frac{1}{2} \times (-14)$$

$$= -7.$$

$$23. \text{解: } (1) \text{原式} = 1 \times (-1) - (-2) \times 3 = -1 + 6 = 5.$$

$$(2) \text{因为 } |x+y+5| + (xy-2)^2 = 0,$$

$$\text{所以 } x+y = -5, xy = 2.$$

$$\begin{aligned} \text{所以原式} &= 1 \times (6x+1) - (-3) \times (8xy+2y) \\ &= 6x+1+24xy+6y \\ &= 6(x+y)+24xy+1 \\ &= -30+48+1 \\ &= 19. \end{aligned}$$

$$24. \text{解: } (1) \text{方案一: } 800 \times 10 + 200(x-10) = (200x + 6\,000) \text{ 元}.$$

$$\text{方案二: } (800 \times 10 + 200x) \times 90\% = (180x + 7\,200) \text{ 元}.$$

$$(2) \text{当 } x = 30 \text{ 时},$$

$$\text{方案一: } 200 \times 30 + 6\,000 = 12\,000(\text{元}).$$

$$\text{方案二: } 180 \times 30 + 7\,200 = 12\,600(\text{元}).$$

因为 $12\,000 < 12\,600$, 所以按方案一购买较为合算.

(3) 先按方案一购买 10 台微波炉送 10 台电磁炉, 再按方案二购买 20 台电磁炉, 共需付款 $10 \times 800 + 200 \times 20 \times 90\% = 11\,600(\text{元})$.

$$25. \text{解: } (1) m-n$$

$$(2) (m+n)^2 - 4mn = (m-n)^2$$

$$(3) (m+n)^2 - 4mn = (m-n)^2$$

$$(4) \text{由(3)可知 } (a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2,$$

$$\text{即 } 36 - 20 = (a-b)^2 = 16.$$

$$\text{当 } a-b \text{ 的值为 } 4 \text{ 或 } -4 \text{ 时}, (a-b)^2 = 16,$$

所以 $a-b$ 的值为 ± 4 .

$$26. \text{解: } (1) 0 \quad 0 \quad 0$$

(2) 无论 x 为何值, 输出的答案都是 0

(3)由计算程序可知,输出的结果为 $(x^2+x)\div 2-\frac{1}{2}x^2$
 $-\frac{1}{2}x=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x$
 $=0$.

27. 解: (1)4

(2)①2或-4 ②-2, -1, 0, 1, 2, 3

③存在.通过数轴易知 $|x+1|-|x-3|$ 的最大值为-1与3之间的距离,即最大值为 $3-(-1)=4$,此时 x 的值可以是6(大于或等于3的所有值均可).

第五章 一元一次方程

5.1 方程

第1课时 从算式到方程

【课堂导学】

任务一

探究1 解: $(3-1)\div(1.2-0.8)=5(\text{h})$.

探究2 解: 在这个问题中,甲、乙两队的行进速度是已知的,甲、乙两队出发点距大本营的路程也是已知的,行进的时间和路程是未知的.当甲队追上乙队,甲队距大本营的路程=乙队距大本营的路程.

探究3 解: 甲队距大本营的路程为 $(1.2x+1)\text{km}$,乙队距大本营的路程为 $(0.8x+3)\text{km}$.

探究4 解: $1.2x+1=0.8x+3$.

新知生成 (1)未知数 相等关系 等式 等式

【即时测评】

解: (2)(3)(4)(5)是方程.

任务二

例 解: (1)设小明今年 a 岁.

列得方程 $2a+12=40$.

(2)设正方形绿地的边长为 x m.

列得方程 $x(x+5)=1\ 050$.

【即时测评】

解: (1)设买甲种水果 x kg.

由题意,得 $8x+12(11-x)=112$.

(2)设小明借给了小强 x 本图书.

由题意,得 $2(26-x)=37+x$.

【课堂小结】

未知数 等式

【当堂检测】

1. 解: 设卖出铅笔 x 支,则卖出圆珠笔 $(60-x)$ 支.

根据题意,得 $1.2\times 0.8x+2\times 0.9(60-x)=87$.

2. 解: 设沿跑道跑 x 周.

根据题意,得 $400x=3\ 000$.

3. 解: 设甲种铅笔买了 x 支,则乙种铅笔买了 $(20-x)$ 支.

根据题意,得 $0.3x+0.6(20-x)=9$.

4. 解: 设上底为 x cm,则下底为 $(x+2)$ cm.

根据题意,得 $\frac{1}{2}(x+x+2)\times 5=40$.

【课后评价】

1. D 2. D

3. C 解析: 设某数为 x ,

A. $x^2-x=6$,是方程,故本选项不符合题意;

B. $2(x+3)=14$,是方程,故本选项不符合题意;

C. $x-\frac{1}{2}x$,不是方程,故本选项符合题意;

D. $3x+7=29$,是方程,故本选项不符合题意.

4. B 5. $1.5x+x+y=30$ 6. C 7. D

8. 解: 设截下的那段电线的长度为 x m.

根据题意,得 $90-x=40+x$.

9. 解: (1)设这个班有男生 x 人,则女生有 $(\frac{4}{5}x+3)$ 人.

根据题意,得 $x+\frac{4}{5}x+3=48$.

(2)设 x 个月后这辆汽车将行驶20 800 km.

根据题意,得 $12\ 000+800x=20\ 800$.

(3)设内沿小圆的半径是 x cm.

根据题意,得 $\pi\times 10^2-\pi x^2=200$.

10. 解: 设获得一等奖的学生有 x 人,则获得二等奖的学生有 $(20-x)$ 人.

依题意,得 $800x+400(20-x)=10\ 000$.

11. 解: 设前年这个镇居民人均可支配收入为 x 元.

由题意,得 $(1+6.8\%)x=30\ 438$.

12. 解: (1)设选手甲答对了 x 道题,则答错或不答 $(20-x)$ 道题.

依题意,得 $5x-2(20-x)=72$.

(2)设这一天售出成人票 m 张,则售出学生票 $(128-m)$ 张.

依题意,得 $10m+10\times 0.6(128-m)=912$.

13. 解: (1) $8x+5=9x-35$.

(2) $\frac{x-5}{8}=\frac{x+35}{9}$.

第2课时 一元一次方程

【课堂导学】

任务一

探究1 解: 由题意,得 $2x+5=3x-1$.

探究2 解: 当 $x=5$ 时,左边=15,右边=14,左边 $\neq$ 右边;

当 $x=6$ 时,左边=17,右边=17,左边=右边;

当 $x=7$ 时,左边=19,右边=20,左边 $\neq$ 右边.

新知生成 相等 未知数 方程的解

【即时测评】

解: 当 $x=3$ 时,方程左边= $2\times 9=18$,右边=32.

因为左边 $\neq$ 右边,所以 $x=3$ 不是此方程的解.

当 $x=4$ 时,方程左边= $2\times 16=32$,右边=32.

因为左边=右边,所以 $x=4$ 是此方程的解.

当 $x=5$ 时,方程左边= $2\times 25=50$,右边=32.

因为左边 $\neq$ 右边,所以 $x=5$ 不是此方程的解.

任务二

探究1 解: 均只含有一个未知数,且未知数的次数都是1.

探究2 解: 等式两边都是整式.

探究3 解: 例如, $6x-5=7$, $2(3x-1)=5x+6$.(答案不唯一)

新知生成 一个 整式 1

【即时测评】

1. ②③⑤

2. 解: (2)(3)为方程;(2)为一元一次方程.

【课堂小结】

相等 未知数 方程的解 ①一个 ②整式 ③1


【当堂检测】

1. C

2. 解: 将 $x=2$ 代入,方程左边= $2\times 2-3=1$,方程左、右边的值不相等,所以 $x=2$ 不是该方程的解;

将 $x=4$ 代入,方程左边= $2\times 4-3=5$,方程左、右边的值相等,所以 $x=4$ 是该方程的解.

3. 解: 如图.



4. 解: 因为 $x=1$ 是方程 $x^2-2mx+1=0$ 的一个解,
所以 $1-2m+1=0$, 所以 $m=1$.

【课后评价】

1. A 2. C 3. -8 4. A 5. D 6. B 7. D

8. C 9. -3 10. -2 11. -1 12. 2 022

13. 解: (1) 把 $x=4$ 代入方程, 得方程左边 $=4 \times 4=16$, 方程右边 $=8-2 \times 4=0$, 左边 $\neq$ 右边, 所以 $x=4$ 不是该方程的解.

把 $x=\frac{4}{3}$ 代入方程, 得方程左边 $=4 \times \frac{4}{3}=\frac{16}{3}$, 方程右边 $=8-2 \times \frac{4}{3}=\frac{16}{3}$, 左边 = 右边, 所以 $x=\frac{4}{3}$ 是该方程的解.

(2) 将 $x=-1$ 代入方程, 得方程左边 $=-2 \times 0=0$, 方程右边 $=4 \times 0=0$, 左边 = 右边, 所以 $x=-1$ 是该方程的解.

将 $x=-2$ 代入方程, 得方程左边 $=2 \times (-2) \times (-1)=4$, 方程右边 $=4 \times (-1)=-4$, 左边 $\neq$ 右边, 所以 $x=-2$ 不是该方程的解.

14. 解: (1) 根据甲班植树的棵数比乙班多 20%, 得甲班植树的棵数为 $(1+20\%)x$;

根据乙班植树的棵数比甲班的一半多 10 棵, 得甲班植树的棵数为 $2(x-10)$.

(2) 列方程为 $(1+20\%)x=2(x-10)$.

(3) 把 $x=25$ 分别代入 (2) 中方程的左边和右边, 得

方程左边 $=(1+20\%) \times 25=30$,

方程右边 $=2 \times (25-10)=30$.

因为方程左边 = 方程右边,

所以 $x=25$ 是方程 $(1+20\%)x=2(x-10)$ 的解, 即乙班植树的棵数是 25.

$(1+20\%) \times 25=30$ (棵).

故甲班植树的棵数是 30, 而不是 35.

15. 解: (1) $x=a$

(2) $x=a$

(3) 把 $x=a$ 代入, 方程左边 $=a^3+a$ = 方程右边, 所以猜想正确.

(4) $(x-1)^3+x=(a+1)^3+a+2$.

整理, 得 $(x-1)^3+x-1=(a+1)^3+a+1$.

所以 $x-1=a+1$,

解得 $x=a+2$.

第 3 课时 等式的性质

【课堂导学】

任务一

问题 1 $b=a$ $a=c$

问题 2 $=$ $=$ $=$ $=$ $=$

新知生成 同一个数 (或式子) 相等 $a \pm c = b \pm c$ 同

一个数 不为 0 的数 相等 $ac = bc$ $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

【即时测评】

解: (1) 根据等式的性质 1, 等式两边加 $2x$, 结果仍相等. 故答案为 $2x$.

(2) 根据等式的性质 1, 等式两边加 $2n$, 结果仍相等. 故答案为 5.

(3) 根据等式的性质 2, 等式两边乘 -6 , 结果仍相等. 故答案为 -6 .

(4) 根据等式的性质 2, 等式两边除以 2, 结果仍相等. 故答案为 2.

任务二

例 解: (1) 方程两边加 4, 得

$x-4+4=26+4$,

化简, 得 $x=30$.

(2) 方程两边除以 -5 , 得

$-5x \div (-5) = 30 \div (-5)$,

化简, 得 $x=-6$.

(3) 方程两边减 5, 得

$-\frac{1}{3}x+5-5=4-5$,

化简, 得 $-\frac{1}{3}x=-1$,

方程两边乘 -3 , 得 $x=3$.

【即时测评】

1. 解: (1) 方程两边减 6, 得 $x=11$.

(2) 方程两边加 1, 得 $2x=-2$,

方程两边除以 2, 得 $x=-1$.

2. 解: (1) 方程两边加 5, 得 $x-5+5=6+5$, 化简, 得 $x=11$.

检验: 将 $x=11$ 代入方程 $x-5=6$ 的左边, 得 $11-5=6$.

方程左、右边的值相等, 所以 $x=11$ 是方程的解.

(2) 方程两边除以 0.3, 得 $x=150$.

检验: 将 $x=150$ 代入方程 $0.3x=45$ 的左边, 得 $0.3 \times 150=45$.

方程左、右边的值相等, 所以 $x=150$ 是方程的解.

【课堂小结】

同一个数 (或式子) 相等 $a \pm c = b \pm c$ 同一个数 同

一个不为 0 的数 相等 $ac = bc$ $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

【当堂检测】

1. A 2. B

3. 解: (1) 方程两边除以 -3 , 得 $x=-5$.

(2) 方程两边加 -1 , 得 $-\frac{1}{3}x=-3$,

方程两边乘 -3 , 得 $x=9$.

【课后评价】

1. C 2. B 3. A 4. B

5. B 解析: A. $4x-5=3x+2$ 变形, 得 $4x-3x=2+5$, 故 A 选项错误;

B. $3(x-1)=2(x+3)$ 变形, 得 $3x-3=2x+6$, 故 B 选项正确;

C. $\frac{2}{3}y-1=\frac{1}{2}y+3$ 变形, 得 $4y-6=3y+18$, 故 C 选项错误;

D. $3m=2$ 变形, 得 $m=\frac{2}{3}$, 故 D 选项错误.

6. 5 7. C 8. C 9. B 10. 4

11. 解: (1) 等式的性质 1

(2) ③ x 的值可能为 0

(3) $x-4=3x-4$,

$x-4+4=3x-4+4$,

$x=3x$,

$x-3x=0$,

$-2x=0$,

$x=0$.

12. 解: (1) $5x-3=7$,

$5x=10$,

$x=2$.

(2) $2x+7=\frac{1}{2}x-2$,

$2x-\frac{1}{2}x+7-7=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}x-2-7$,

$\frac{3}{2}x=-9$,

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{2}x=-9 \times \frac{2}{3}$,

$x=-6$.

13. 解: (1)是

(2) $0.\dot{2}\dot{3}$ 是有理数.理由如下:

设 $0.\dot{2}\dot{3}=x$, 则 $x=0.232\ 3\cdots$,

所以 $100x=23.232\ 3\cdots$,

所以 $100x-x=23$,

解得 $x=\frac{23}{99}$.

所以 $0.\dot{2}\dot{3}=\frac{23}{99}$.

所以 $0.\dot{2}\dot{3}$ 是有理数.

5.2 解一元一次方程

第1课时 合并同类项、移项解一元一次方程

【课堂导学】

任务一

探究1 解: (1) $-2x$ (2) $4x$ (3) $4y$ (4) $-y$

探究2 解: $6x=-78$.

探究3 解: 系数化为1, 得 $x=-13$.依据是等式的性质2.

探究4 解: 将方程化为 $ax=b$ 的形式, 更接近 $x=a$ 的形式.

[即时测评]

解: (1) $x=-4$. (2) $m=\frac{3}{2}$.

任务二

探究1 解: 设这个班有 x 名学生.

由题意, 得 $2x+30=3x-20$.

探究2 解: 方程 $2x+30=3x-20$ 的两边都有含 x 的项($2x$ 与 $3x$)和不含字母的常数项(30 与 -20).

探究3 解: 可以利用等式的性质1变形为 $2x+30-3x-30=3x-20-3x-30$, 即 $2x-3x=-20-30$, 即可求解.

新知生成 (1)变号 (2)等式的性质1 (3)改变

[即时测评]

1. C

2. 解: (1)移项, 得 $5x-2x=-10+7$,

合并同类项, 得 $3x=-3$,

系数化为1, 得 $x=-1$.

(2)移项, 得 $-0.3x-1.2x=9-3$,

合并同类项, 得 $-1.5x=6$,

系数化为1, 得 $x=-4$.

任务三

例 解: 设 x s 后小明追上小刚.

由题意, 得 $4x+10=6x$.

移项, 得 $4x-6x=-10$,

合并同类项, 得 $-2x=-10$,

系数化为1, 得 $x=5$.

答: 5 s 后小明追上小刚.

[即时测评]

解: 设这个班有 x 名学生.

由题意, 得 $3x+21=4x-27$,

解得 $x=48$.

答: 这个班有 48 名学生.

【课堂小结】

等式的性质1 分配律 等式的性质2

【当堂检测】

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C

6. $2x-1+x=56$

7. 解: (1) $x=-2$. (2) $x=2$.

8. 解: 设计划生产 I 型洗衣机 x 台, 则计划生产 II 型洗衣机 $2x$ 台, III 型洗衣机 $14x$ 台.

依题意, 得 $x+2x+14x=25\ 500$,

解得 $x=1\ 500$.

所以 $2x=3\ 000$, $14x=21\ 000$.

答: 计划生产 I 型洗衣机 1 500 台, II 型洗衣机 3 000 台,

III 型洗衣机 21 000 台.

【课后评价】

1. C 2. $5x=15$ 3. C 4. 4 5. $-\frac{1}{12}$

6. -2 7. A 8. D

9. $3x+12$ $4x-24$ $3x+12=4x-24$

$x=36$ 36

10. 160 11. A 12. C 13. 7

14. $6x+10x=15+70-90$ $16x=-5$

$x=-\frac{5}{16}$

15. -2 16. $\frac{1}{2}x+x+2x=34\ 685$ 17. -64

18. 解: (1)移项, 得 $4x-x=9$.

合并同类项, 得 $3x=9$.

系数化为1, 得 $x=3$.

(2)移项, 得 $4x-2x=5+1$.

合并同类项, 得 $2x=6$.

系数化为1, 得 $x=3$.

(3)移项, 得 $x-\frac{1}{3}x=-2-\frac{4}{3}$.

合并同类项, 得 $\frac{2}{3}x=-\frac{10}{3}$.

系数化为1, 得 $x=-5$.

19. 解: 设该集团第二季度销售冰箱 x 台, 则第一季度销售冰箱 $2x$ 台, 第三季度销售冰箱 $4x$ 台.

根据题意, 得 $x+2x+4x=2\ 800$,

解得 $x=400$.

答: 该集团第二季度销售冰箱 400 台.

20. 解: 设甲、乙、丙三种草药分别需要 $2x$ g, $3x$ g, $7x$ g.

根据题意, 得 $2x+3x+7x=1\ 440$,

解得 $x=120$.

则 $2x=240$, $3x=360$, $7x=840$.

答: 甲、乙、丙三种草药分别需要 240 g, 360 g, 840 g.

21. 解: (1)15

(2)取第一列三个式子, 得 $(x+3)+(x-2)+(x-1)=3x$,

则第一行第三列的代数式为 $3x-(x+3)-(x-4)=x+1$,

第二行第三列的代数式为 $3x-(x-2)-x=x+2$,

第三行第二列的代数式为 $3x-(x-1)-(x-3)=x+4$.

补全题图(3)幻方如图.

$x+3$	$x-4$	$x+1$
$x-2$	x	$x+2$
$x-1$	$x+4$	$x-3$

(3)由题意, 得 $17+2x=x+5+3x$,

解得 $x=6$.

第2课时 去括号解一元一次方程

【课堂导学】

任务一

探究1 解: 上半年用电量+下半年用电量=全年用电量.

探究2 解: 下半年平均每月的用电量为 $(x-2\ 000)\text{kW}\cdot\text{h}$, 上半年用电量为 $6x\text{kW}\cdot\text{h}$, 下半年用电量为 $6(x-2\ 000)\text{kW}\cdot\text{h}$. 列方程, 得 $6x+6(x-2\ 000)=150\ 000$.

探究3 解:多了括号,解法略.

[归纳总结] (2)不变 改变

[即时测评]

解:(1) $6x = -2(3x-5) + 10$,
去括号,得 $6x = -6x + 10 + 10$,
移项,得 $6x + 6x = 10 + 10$,
合并同类项,得 $12x = 20$,

系数化为1,得 $x = \frac{5}{3}$.

(2) $-2(x+5) = 3(x-5) - 6$,
去括号,得 $-2x - 10 = 3x - 15 - 6$,
移项,得 $-2x - 3x = -15 - 6 + 10$,
合并同类项,得 $-5x = -11$,

系数化为1,得 $x = \frac{11}{5}$.

任务二

例 解:设船在静水中的平均速度为 x km/h,则顺水速度为 $(x+4)$ km/h,逆水速度为 $(x-4)$ km/h.

根据题意,得 $3(x+4) = 5(x-4)$,

去括号,得 $3x + 12 = 5x - 20$,

移项、合并同类项,得 $-2x = -32$,

系数化为1,得 $x = 16$.

答:船在静水中的平均速度为 16 km/h.

[即时测评]

解:设飞机在无风时的速度为 x km/h,则在顺风中的速度为 $(x+24)$ km/h,在逆风中的速度为 $(x-24)$ km/h.

根据题意,得 $\frac{17}{6}(x+24) = 3(x-24)$,

解得 $x = 840$.

$3 \times (840 - 24) = 2\ 448$ (km).

答:两城之间的距离为 2 448 km.

【课堂小结】

(1)去括号 (2)移项 (3)合并同类项 (4)系数化为1

【当堂检测】

1. D 2. D

3. 解:(1) $x = 5$. (2) $x = 2$.

【课后评价】

1. A 2. C 3. C 4. D 5. A 6. D

7. D 解析:因为 $a * b = ab - 2a$,

所以 $(3 * x) + (x * 3) = 3x - 2 \times 3 + 3x - 2x = 4x - 6 = 14$,解得 $x = 5$.

8. A 9. 4

10. 解:解答过程不正确.错误的步骤为第一步,原因是在去括号时,方程左边 $-4x$ 漏乘了 2,方程右边 -1 漏乘了 -3 .

正确解答过程如下:

去括号,得 $6 - 8x = 1 - 6x + 3$.

移项,得 $-8x + 6x = 1 + 3 - 6$.

合并同类项,得 $-2x = -2$.

系数化为1,得 $x = 1$.

11. 解:(1) $5x + 10 = 10x - 2$,

$-10x + 5x = -10 - 2$,

$-5x = -12$,

$x = \frac{12}{5}$.

(2) $x + 1 - 2x + 2 = 1 - 3x$,

$x - 2x + 3x = 1 - 1 - 2$,

$2x = -2$,

$x = -1$.

12. 解:(1)令 $3(2-x) = 2(3+x)$,

$6 - 3x = 6 + 2x$,

$-3x - 2x = 6 - 6$,

$-5x = 0$,

$x = 0$.

所以当 $x = 0$ 时,代数式 $3(2-x)$ 和 $2(3+x)$ 的值相等.

(2)令 $2(3y+4) - 3 = 5(2y-7)$,

$6y + 8 - 3 = 10y - 35$,

$6y - 10y = -35 - 8 + 3$,

$-4y = -40$,

$y = 10$.

所以当 $y = 10$ 时,代数式 $2(3y+4)$ 的值比 $5(2y-7)$ 的值大 3.

13. 解:(1)由题意,得

$2(50+a) + 2(50-a) = 100 + 2a + 100 - 2a = 200$ (km).

答:2 h 后两船相距 200 km.

(2)由题意,得

$2(50+a) - 2(50-a) = 100 + 2a - 100 + 2a = 4a$ (km).

答:2 h 后甲船比乙船多航行 4a km.

(3) $v = 2a$

第3课时 去分母解一元一次方程

【课堂导学】

任务一

探究1 解:汽车从王家庄到青山的速度=汽车从王家庄到绿水的速度.(答案不唯一)

探究2 解: $\frac{x-50}{3} = \frac{x+70}{5}$. (答案不唯一)

探究3 解:这个方程中未知数的系数不是整数.先化去分母,把未知数的系数化成整数,再解方程即可.(详细解方程步骤略)

[归纳总结] (1)最小公倍数 (2)等式的性质 2

不含分母 (3)括号

[即时测评]

1. B

2. 解:去分母,得 $3(3-4x) = 2(2-5x) + 6$,

去括号,得 $9 - 12x = 4 - 10x + 6$,

移项,得 $-12x + 10x = 4 + 6 - 9$,

合并同类项,得 $-2x = 1$,

系数化为1,得 $x = -\frac{1}{2}$.

任务二

例 解:设这批零件共有 x 个.

由题意,得 $\frac{x-15}{5} = \frac{x+10}{6}$,

解得 $x = 140$.

答:这批零件共有 140 个.

[即时测评]

解:设该单位参加旅游的职工有 x 人.

由题意,得 $\frac{x}{40} - \frac{x+40}{50} = 1$,

解得 $x = 360$.

答:该单位参加旅游的职工有 360 人.

【课堂小结】

等式的性质 2 去括号法则 等式的性质 1 分配律

等式的性质 2

【当堂检测】

1. C 2. $\frac{8}{3}$

3. 解:(1) $x = \frac{9}{2}$. (2) $x = -7$.

【课后评价】

1. C 2. D 3. C 4. -10 5. C 6. D 7. B

8. B 解析:原方程可以化为 $\frac{12x+3}{4} + 1 = \frac{5x-60}{3} - \frac{1}{2}x$.

... 第一步

去分母,得 $3(12x+3)+12=4(5x-60)-6x$.…第二步
去括号,得 $36x+9+12=20x-240-6x$.…第三步
移项,得 $36x-20x+6x=-240-9-12$.…第四步
合并同类项,得 $22x=-261$.

系数化为1,得 $x=-\frac{261}{22}$.

所以最先出错的步骤是第二步.

9. $-\frac{43}{19}$

10. 解:(1)去分母,得 $2(2x-1)-(5x+1)=6$.

去括号,得 $4x-2-5x-1=6$.

移项,得 $4x-5x=6+2+1$.

合并同类项,得 $-x=9$.

系数化为1,得 $x=-9$.

(2)去分母,得 $3(3x-1)-12=2(5x-7)$.

去括号,得 $9x-3-12=10x-14$.

移项,得 $9x-10x=-14+3+12$.

合并同类项,得 $-x=1$.

系数化为1,得 $x=-1$.

11. 解:(1)设乙的速度是 x km/h,则甲的速度是 $(x+4)$ km/h.

根据题意,得 $\left(3+\frac{1}{4}\right)(x+4)+3x=88$,

解得 $x=12$.所以 $x+4=12+4=16$.

答:乙的速度是 12 km/h,甲的速度是 16 km/h.

(2)①设 A, B 两地间的距离为 y km.

根据题意,得 $\frac{y-36}{2}=\frac{y+36}{4}$,

解得 $y=108$.

答:A, B 两地间的距离为 108 km.

② $3a$

5.3 实际问题与一元一次方程

第1课时 实际问题与一元一次方程(1)

【课堂导学】

任务一

探究1 解:螺母数量 $= 2 \times$ 螺栓数量.

探究2 $1\ 200x$ $(22-x)$ $2\ 000(22-x)$

探究3 解:设应安排 x 名工人生产螺栓, $(22-x)$ 名工人生产螺母.

由题意,得 $2\ 000(22-x)=2 \times 1\ 200x$,

解得 $x=10$.

所以 $22-x=12$.

答:应安排 10 名工人生产螺栓, 12 名工人生产螺母.

探究4 解:设应安排 x 名工人生产螺母, $(22-x)$ 名工人生产螺栓.

由题意,得 $2\ 000x=2 \times 1\ 200(22-x)$,

解得 $x=12$.

所以 $22-x=10$.

答:应安排 10 名工人生产螺栓, 12 名工人生产螺母.

【即时测评】

解:设应分配 x 张红纸制作春联,则分配 $(70-x)$ 张红纸制作福字.

根据题意,得 $2 \times 2x=10(70-x)$,

解得 $x=50$.

所以 $70-x=70-50=20$.

答:应分配 50 张红纸制作春联, 20 张红纸制作福字,才能使制作的春联和福字刚好配套.

任务二

探究1 甲工作量 乙工作量

探究2 $\frac{3}{15}$ $\frac{3+x}{10}$

探究3 解:由题意,得 $\frac{3}{15}+\frac{3+x}{10}=1$,

解得 $x=5$.

答:还需要 5 天完成.

[归纳总结] (1)工作量 $=$ 工作效率 $\times$ 工作时间

(2)①各时间段的工作量之和 ②各工作者的工作量之和

【即时测评】

解:设甲做了 x h.

由题意,得 $\frac{1}{40}x+\frac{1}{30}(x+2)=1$,

解得 $x=16$.

答:甲做了 16 h.

【当堂检测】

1. $\frac{x}{10}+\frac{x-2}{15}=1$

2. 解:设用 x m³ 的木材做桌面,则用 $(10-x)$ m³ 的木材做桌腿.

根据题意,得 $4 \times 50x=300(10-x)$,

解得 $x=6$.

所以 $10-x=4$.

可做方桌 $50 \times 6=300$ (张).

答:用 6 m³ 的木材做桌面, 4 m³ 的木材做桌腿刚好配套,共可生产 300 张方桌.

【课后评价】

1. A 2. 8 6 3. A 4. D 5. 6

6. 解:设应调往甲处 x 人,则应调往乙处 $(20-x)$ 人.

由题意,得 $27+x=2[19+(20-x)]$,

解得 $x=17$.

$20-x=3$.

答:应调往甲处 17 人,调往乙处 3 人.

7. 解:设每天安排 x 名工人生产桌子, $(32-x)$ 名工人生产椅子.

由题意,得 $2 \times 15x=50(32-x)$,

解得 $x=20$.

答:当每天安排 20 名工人生产桌子时,生产的桌子和椅子刚好配套.

8. 解:(1)设需增加 x 人帮忙才能在规定的时间内完成.

由题意,得 $\frac{8}{80}+\frac{(32-8)(x+1)}{80}=1$,

解得 $x=2$.

答:需增加 2 人帮忙才能在规定的时间内完成.

(2)设应该安排 x 人先工作.

由题意,得 $\frac{4x}{80}+\frac{4(x+3)}{80}=\frac{3}{4}$,

解得 $x=6$.

答:应该安排 6 人先工作.

9. 解:(1)设甲、乙两队合作 t 天.

由题意,得 $\frac{20+t}{60}+\frac{t}{90}=1$,

解得 $t=24$.

答:甲、乙两队合作 24 天.

(2)设甲、乙合作完成需 y 天.

根据题意,得 $\left(\frac{1}{60}+\frac{1}{90}\right)y=1$,

解得 $y=36$.

①甲单独完成需付工程款为 $60 \times 3.5=210$ (万元).

②乙单独完成超过计划天数不符合题意.

③甲、乙合作完成需付工程款为

$36 \times (3.5+2)=198$ (万元).

因为 $198 < 210$,所以由甲、乙两队全程合作完成该工程省钱.

第2课时 实际问题与一元一次方程(2)

【课堂导学】

任务一

问题1 (1)180 (2)30 20% (3)0.9a
(4)1.25a (5)16

问题2 购进商品时的价格(有时也叫进价);
在销售商品时的售出价(有时称成交价);
在销售时标出的价(有时称定价);
销售价占标价的百分率,例如,某种服装打八折即按标价的80%出售.

[归纳总结] (1)售价-进价=利润

(2)进价 $\times$ 利润率=利润 利润率= $\frac{\text{利润}}{\text{进价}}$

(3)标价 $\times$ 折扣=售价

(4)售价-进价=进价 $\times$ 利润率

[即时测评]

(1)25% (2)0.8x (3)1.4x (4)10(1+p%)

任务二

探究1 解:答案不唯一.销售的盈亏取决于成本与收入的比较.

探究2 解:设商品的成本为 x 元.由题意,得
 $0.8 \times (1+20\%)x = 168$,解得 $x = 175$.

答:商品的成本是175元.

探究3 解: $168 - 175 = -7$ (元).

所以售出这件商品亏损了7元.

[即时测评]

解:设这种服装每件的标价是 x 元.
根据题意,得 $10 \times 0.8x = 11(x - 30)$,
解得 $x = 110$.

答:这种服装每件的标价为110元.

【课堂小结】

售价 利润 标价 利润率

【当堂检测】

1. D 2. D

【课后评价】

1. B 2. D 3. A 4. C 5. D

6. C 解析:设盈利的一件原价是 x 元.

根据题意,得 $(1+25\%)x = 135$,

解得 $x = 108$.

比较可知,盈利的一件赚了27元.

设亏本的一件原价是 y 元.

根据题意,得 $(1-25\%)y = 135$,

解得 $y = 180$.

比较可知,亏本的一件亏了45元.

则一共亏了18元.

7. D 8. 8 9. 486

10. 18或46.8 解析:①若第二次购物超过300元.

设所购物品价值为 x 元.

由题意,得 $90\%x = 288$,

解得 $x = 320$.

两次所购物总价值为 $180 + 320 = 500 > 300$.

所以享受九折优惠,因此应付 $500 \times 90\% = 450$ (元).

这两次购物合并成一次性付款可节省 $180 + 288 - 450 = 18$ (元).

②若第二次购物没有超过300元,两次所购物总价值为 $180 + 288 = 468$ (元).

这两次购物合并成一次性付款可以节省 $468 \times 10\% = 46.8$ (元).

故答案为18或46.8.

11. 解:(1)180

(2)因为 $500 \times 0.9 = 450$ (元), $490 > 450$,

所以第2次购物超过500元.

设第2次购物商品的总价是 x 元.

由题意,得 $500 \times 0.9 + (x - 500) \times 0.8 = 490$,

解得 $x = 550$.

$550 - 490 = 60$ (元).

答:第2次购物节约了60元钱.

(3) $200 + 550 = 750$ (元),

$500 \times 0.9 + (750 - 500) \times 0.8 = 450 + 200 = 650$ (元).

因为 $180 + 490 = 670 > 650$,

所以小丽将这两次购得的商品合为一次购买更省钱.

12. 解:(1)设甲种商品每件进价为 x 元.

则 $60 - x = 50\%x$,解得 $x = 40$.

故甲种商品每件进价为40元.

乙种商品的利润率为 $(80 - 50) \div 50 = 60\%$.

故答案为40;60%.

(2)设购进甲种商品 x 件,则购进乙种商品 $(50 - x)$ 件.

由题意,得 $40x + 50(50 - x) = 2100$,

解得 $x = 40$.

所以购进甲种商品40件.

(3)设小华打折前应付款为 y 元.

①打折前购物金额超过450元,但不超过600元.

由题意,得 $0.9y = 504$,

解得 $y = 560$.

$560 \div 80 = 7$ (件).

②打折前购物金额超过600元.

$600 \times 0.82 + (y - 600) \times 0.3 = 504$,

解得 $y = 640$.

$640 \div 80 = 8$ (件).

综上所述,小华在该商场购买乙种商品7件或8件.

第3课时 实际问题与一元一次方程(3)

【课堂导学】

任务

探究1 略

探究2 解:根据E队积分可知负一场积1分.

探究3 解:设胜一场积 x 分.

依题意,得 $10x + 1 \times 2 = 22$,

解得 $x = 2$.

经检验, $x = 2$ 符合题意.

所以胜一场积2分.

探究4 解:设一个队胜 x 场,则负 $(18 - x)$ 场.

依题意,得 $2x = 18 - x$,

解得 $x = 6$.

$18 - 6 = 12$ (场).

所以当某队胜6场、负12场时,它的胜场总积分能等于它的负场总积分.

探究5 解:设D队在18场比赛中胜了 x 场.若最终积分达到32分,则 $2x + (18 - x) = 32$,

解得 $x = 14$.

进而可得出后面还需胜8场.

由表中数据可知D队已经比了11场,若全部赛完还需再比7场,而 $8 > 7$,

因此D队积分不可能达到32分.

[即时测评]

解:设该班共胜了 x 场,则平了 $(7 - x)$ 场.

依题意,得 $3x + (7 - x) = 17$,

解得 $x = 5$.

答:该班共胜了5场比赛.

【课堂小结】

等量 ②方程的解是否符合题意

【当堂检测】

1. C 2. 4 3. 20

4. 解:设该选手答对了 x 道题,则有 $(20 - x)$ 道题答错或不答.

由题意,得 $8x - (20 - x) \times 3 = 116$,

解得 $x=16$.

答:他答对了 16 道题.

【课后评价】

1. C 2. A 3. A 4. 5 5. D

6. C 解析: 设小长方形的宽为 x , 长为 y , 大长方形的宽为 n .

由题图(1)得 $4x=n$.

由题图(2)得 $2x+y=m$, $y=3x$,

所以 $5x=m$.

所以 $x=\frac{m}{5}$.

题图(1)中阴影部分的周长为

$$2n+2y+(m-y)+(m-y-x)+x=2n+2m=8x+2m=\frac{18}{5}m.$$

题图(2)中阴影部分的周长为

$$2(n-3x)+2m=2(4x-3x)+2m=2x+2m=\frac{12}{5}m.$$

所以阴影部分的周长之差为 $\frac{18}{5}m-\frac{12}{5}m=\frac{6}{5}m$.

7. 19 8. 6

9. 解: (1) 设 A 队胜了 x 场, 则平了 $(12-x)$ 场.

由题意, 得 $3x+(12-x)=20$,

解得 $x=4$.

$12-4=8$ (场).

答: A 队胜 4 场、平 8 场.

(2) 因为每场比赛出场费 500 元, 所以 12 场比赛出场费共 6 000 元.

赢了 4 场, 奖金为 $1\,500 \times 4 = 6\,000$ (元),

平了 8 场, 奖金为 $700 \times 8 = 5\,600$ (元),

所以奖金加出场费一共 $6\,000 + 6\,000 + 5\,600 = 17\,600$ (元).

答: A 队每名队员所得奖金与出场费累计为 17 600 元.

10. 解: (1) 补全表格如下.

	甲仓库	乙仓库
A 工地	x t	$(70-x)$ t
B 工地	$(100-x)$ t	$(x+10)$ t

(2) 运送甲仓库 100 t 水泥的运费为 $140x+150(100-x) = (-10x+15\,000)$ 元.

故答案为 $(-10x+15\,000)$.

(3) 因为本次运水泥总运费需要 25 900 元,

所以 $-10x+15\,000+200(70-x)+80(x+10)=25\,900$.

所以 $-130x+3\,900=0$, 解得 $x=30$.

答: 甲仓库运到 A 工地的水泥是 30 t.

第 4 课时 实际问题与一元一次方程(4)

【课堂导学】

任务

探究 1 解: $(200+5m)$ 元.

探究 2 解: 当 n 在第一阶梯时, 费用为 500 元;

当 n 在第二阶梯时, 费用为 $500+5(n-50)=(5n+250)$ 元;

当 n 在第三阶梯时, 费用为 $500+250+4(n-100)=(4n+350)$ 元.

探究 3 解: 设这一天该工厂产生的废水总量为 x t, 根据“工厂每天产生超过 100 t 的工业废水”可知 $x>100$.

由探究 2 可知:

① 当第三方企业处理的废水在第二阶梯时, 则有

$$200+5 \times \frac{x}{2} = 5 \times \frac{x}{2} + 250, \text{ 该方程无解, 故舍去;}$$

② 当第三方企业处理的废水在第三阶梯时, 则有

$$200+5 \times \frac{x}{2} = 4 \times \frac{x}{2} + 350,$$

解得 $x=300$.

答: 这一天该工厂产生的废水总量为 300 t.

【即时测评】

解: (1) 方案一: $0.9 \times 160x = 144x$ (元);

方案二: $160 \times 100 + 0.8 \times 160 \times (x-100) = (128x+3\,200)$ 元.

故答案为 $144x$; $(128x+3\,200)$.

(2) 由题意, 得 $144x = 128x + 3\,200$,

解得 $x=200$.

答: 当参观学生为 200 人时, 两种方案购买门票费用一样.

(3) 方案一费用为 $144 \times 240 = 34\,560$ (元);

方案二费用为 $128 \times 240 + 3\,200 = 33\,920$ (元).

$33\,920 < 34\,560$.

答: 学校采用方案二购买门票更省钱.

【当堂检测】

1. 12 2. 20

【课后评价】

1. A 2. B

3. (1) $(20+0.1x)$ 0.2x

(2) 200

(3) 一 二

4. 解: (1) 在甲商场购买队服和护具所需要的费用为 $200 \times 12 + (x-12) \times 50 = (50x+1\,800)$ 元,

在乙商场购买队服和护具所需要的费用为 $(200 \times 12 + 50x) \times 0.85 = (42.5x+2\,040)$ 元.

(2) 根据题意, 得 $42.5x+2\,040 = 50x+1\,800$,

解得 $x=32$.

答: 当购买 32 套护具时, 在甲、乙两商场购买队服和护具所需的费用相同.

(3) 在乙商场购买 18 套护具, 其余在甲商场购买最省钱,

所需总费用为 $12 \times 200 + 18 \times 50 \times 0.85 = 3\,165$ (元).

5. 解: (1) $2\,500+300x$ $1\,500+400x$

(2) 方案一费用更少. 理由如下:

当 $x=12$ 时, $M=2\,500+300 \times 12=6\,100$, $N=1\,500+400 \times 12=6\,300$.

因为此时 $M < N$,

所以方案一费用更少.

(3) 由题意, 得 $2\,500+300x=1\,500+400x$,

解得 $x=10$.

所以当交费时间为 10 个月时, 两种方案的费用相同.

6. 解: (1) 设这种电磁炉的标价是 x 元.

由题意, 得 $0.6(380+x) = 380+x-300$,

解得 $x=370$.

答: 这种电磁炉的标价是 370 元.

(2) 由题意, 得选择甲、乙直播间购买所需费用均为 $0.6 \times (380+370) = 450$ (元);

选择丙直播间购买所需费用为 $380+370-50 \times 7 = 400$ (元).

因为 $400 < 450$,

所以小鹿选择丙直播间购买更合算.

第六章 几何图形初步

6.1 几何图形

第 1 课时 立体图形与平面图形

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: 有点、线段、三角形、四边形、圆、长方体、球等.(合理即可)


探究 2 解: 各部分不都在同一平面内.

探究 3 解: 各部分都在同一平面内.

新知生成 (1) 立体图形 (2) 平面图形


[即时测评]

解: 如图所示.




任务二

探究 1 解: 如图所示.



探究 2 解: 如图所示, 从前面、左面、上面看得到的平面图形都是长方形.




[归纳总结] 前面 左面 上面

[即时测评]

立体图形	从前面看	从左面看	从上面看

任务三

探究 1 解: 如图.



探究 2 解: 正方体的展开图中, 原来相对的两面不相邻.

探究 3 略

新生成 展开图

[即时测评]

C

【当堂检测】

1. B 2. C

【课后评价】

1. D 2. ②③⑥ 3. B 4. C 5. B 6. D 7. A

8. C 解析: ①柱体包括圆柱、棱柱, 柱体的两个底面一样大, 故①正确;

②圆柱、圆锥的底面都是圆, 故②正确;

③棱柱的底面可以为任意多边形, 故③错误;

④长方体符合柱体的条件, 一定是柱体, 故④正确;

⑤棱柱的侧面不可能是三角形, 故⑤错误.

正确的有①②④, 共 3 个.

9. B 10. 我

11. 解: 从 3 个角度正方体上的数字可知, 与写有数字 1 的面相邻的面上数字是 2, 3, 4, 6,

所以数字 1 对面是数字 5.

同理, 数字 3 对面是数字 6; 数字 2 对面是数字 4.

12. 解: (1) 如表.

几何体	顶点数 V	面数 F	棱数 E
A	4	4	6
B	8	6	12
C	6	5	9
D	10	7	15

(2) $E = V + F - 2$ (3) 20 (4) 14

第 2 课时 点、线、面、体

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: 长方体有 6 个面、12 条棱、8 个顶点.

探究 2 解: 这些面有平面和曲面.(合理即可)

探究 3 解: 面与面相交形成了线, 线有直线和曲线.

探究 4 解: 线与线相交得到了点.

[归纳总结] (1) 平面 曲面 (2) 线 直线

曲线 (3) 点

[即时测评]

1. B

2. 9 16 9 四棱锥 四棱柱(长方体)

任务二

探究 1 解: 点在纸上运动时, 形成了线. 举例略.


探究 2 解: 汽车雨刷可以看成线, 它在挡风玻璃上运动时的路线形成了面.

探究 3 解: 圆柱.

[归纳总结] 线 面 体

[即时测评]

解: 连线如图所示.



【课堂小结】

点 线 直线 曲线 线 面 体

【当堂检测】

1. C 2. A


3. 点动成线 线动成面 面动成体

【课后评价】

1. A 2. C 3. B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B

9. A 10. 面动成体 11. 点动成线

12. 解: (1) 如图所示.



(2) I, II, III, IV, V

(3) 图 V 中的几何体由 2 个面围成, 其中一个平面, 一个是曲面, 面与面相交有 1 条线, 是一条曲线.

13. 解: (1) 侧面有 5 个, 底面有 2 个, 共有 $5+2=7$ (个) 面, 侧面积为 $5 \times 2 \times 4 = 40 (\text{cm}^2)$.

(2) 共有 10 个顶点, 15 条棱.

(3) n 棱柱的顶点数为 $2n$; 面数为 $n+2$; 棱的条数为 $3n$.

6.2 直线、射线、线段

第 1 课时 直线、射线、线段

【课堂导学】

任务一

探究 1 解: 至少需要钉 2 颗钉子.

探究 2 解: 在最早和最后的课桌旁拉一条直线, 沿着这条线摆放即可.

探究 3 解: 过一点 O 可以画无数条直线, 过两点 A, B 可以画一条直线. 画图略.

新知生成 一条 一 两点确定一条直线

[即时测评]

解: 两点确定一条直线.

任务二

问题 1 解: 直线 AB (或直线 BA).

问题 2 解: 图(1)中点 O 在直线 l 上, 点 P 在直线 l 外; 图(2)中, 直线 a, b 相交于点 O .

[归纳总结] (2) 上 外 (3) 相交 交点

[即时测评]

①②

任务三

问题 1 解: 射线用它的端点和射线上的另一点来表示 (表示端点的字母必须写在前面) 或用一个小写字母表示. 线段用表示端点的两个大写字母表示或用一个小写字母表示.

问题 2 解: 填表如下:

类型	图形	表示方法	端点数	可否延伸	可否度量
线段		线段 AB (或 BA) 或线段 n	2 个	不可延伸	可度量
射线		射线 OA 或射线 l	1 个	向一个方向无限延伸	不可度量
直线		直线 AB (或 BA) 或直线 m	0 个	向两个方向无限延伸	不可度量

[归纳总结] (1) ①没有 两个 ②一个 一个 ③两个 不能

(2) 射线 直线 直线

[即时测评]

C


【课堂小结】

两点确定一条直线 一个 两个

【当堂检测】

1. C

2. 解: (1)(2) 如图所示.




【课后评价】

1. C 2. C 3. B 4. D 5. D 6. C 7. D 8. C

9. D 10. D 11. 3

12. 解: 如图.



13. 解: (1) 因为以点 A 为左端点的线段有 AB, AC, AD , 以点 C 为左端点的线段有 CD, CB , 以点 D 为左端点的线段有 DB , 所以共有 $3+2+1=6$ (条) 线段.

(2) $\frac{m(m-1)}{2}$. 理由如下:

设线段上有 m 个点, 该线段上共有线段 x 条, 则 $x = (m-1) + (m-2) + (m-3) + \dots + 3 + 2 + 1$, 倒序排列有 $x = 1 + 2 + 3 + \dots + (m-3) + (m-2) + (m-1)$, 所以 $2x = \underbrace{m + m + \dots + m}_{(m-1) \text{ 个 } m} = m(m-1)$.

所以 $x = \frac{m(m-1)}{2}$.

(3) 把 8 名同学看作直线上的 8 个点, 每两名同学之间的一场比赛看作一条线段, 直线上 8 个点所构成的线段条数就等于比赛的场数,

所以一共要进行 $\frac{8 \times (8-1)}{2} = 28$ (场) 比赛.

第 2 课时 线段的比较与运算

【课堂导学】


任务一

探究 1 解: (1) 度量法: 从“数值”的角度比较;

(2) 叠合法: 从“形”的角度比较.

探究 2 解: (1) $<$ (2) 重合 (3) $>$

探究 3 解: 如图, 第一步: 用无刻度的直尺画射线 AF ; 第二步: 用圆规在射线 AF 上截取 $AB = a$, 则线段 AB 即为所求.



新知生成 无刻度的直尺 圆规

[即时测评]

略

任务二

探究 1 解: 能.

探究 2 解: 如图所示.




探究 3 解: 两点的所有连线中, 线段最短.

新知生成 (1) 线段 两点之间, 线段最短

(2) 线段的长度

[即时测评]

解:如图,点P即为所求.



任务三

探究1 解: $AM < AB$, $AB - AM = MB$, $AM + MB = AB$.

探究2 解:如图(1), $AM = BM = \frac{1}{2}AB$;

如图(2), $AM = MN = NB = \frac{1}{3}AB$;

如图(3), $AM = MN = NP = PB = \frac{1}{4}AB$.

【归纳总结】 (1)线段的长度 (3) $\frac{1}{3}$ 3 3 3

[即时测评]

解:因为 $AB = 30$ cm, $AC = \frac{2}{5}AB$,

所以 $AC = \frac{2}{5} \times 30 = 12$ (cm).

所以 $BC = AB - AC = 30 - 12 = 18$ (cm).

因为 $AB = 30$ cm, 点M为线段AB的中点,

所以 $BM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 30 = 15$ (cm).

因为 $BC = 18$ cm, N为线段BC的中点,

所以 $BN = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 18 = 9$ (cm).

所以 $MN = BM - BN = 15 - 9 = 6$ (cm).

【课堂小结】

度量法

【当堂检测】

1. 15 cm 2. 1 或 9

3. 解:由D是线段AC的中点,得 $CD = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}(AB -$

$BC) = \frac{1}{2} \times (10 - 4) = 3$ (cm),

则 $BD = BC + CD = 4 + 3 = 7$ (cm).


【课后评价】

1. C 2. B 3. A

4. C 解析:如图(1),

因为 $AB = 1$ cm, $BC = 3$ cm,

所以 $AC = AB + BC = 4$ cm.



第4题解图

如图(2),

因为 $AB = 1$ cm, $BC = 3$ cm,

所以 $AC = BC - AB = 2$ cm.


所以AC的长为4 cm或2 cm.

5. C 6. B 7. C

8. C 解析:如图(1),当点C在点B左侧时,

$AC = AB - BC = 8 - 4 = 4$ (cm),

所以 $AM = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ (cm).



第8题解图

如图(2),当点C在点B右侧时,


$AC = AB + BC = 8 + 4 = 12$ (cm),

所以 $AM = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \times 12 = 6$ (cm).

综上所述,AM的长为2 cm或6 cm.

9. B

10. 解:(1)如图.



$AC = AB + BC = 4 + 3 = 7$ (cm).

因为O为线段AC的中点,所以 $OC = 3.5$ (cm).

因为 $BC = 3$ cm,

所以 $OB = OC - BC = 3.5 - 3 = 0.5$ (cm).


答:线段AC和OB的长度分别是7 cm, 0.5 cm.

(2)因为M是AC的中点,N是BC的中点,

所以 $CM = \frac{1}{2}AC$, $CN = \frac{1}{2}BC$.

所以 $MN = CM + CN = \frac{1}{2}AC + \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 12 = 6$ (cm).

11. 解:(1)如图,点C和点D即为所求.



(2)①因为 $AB = 2$ cm, B是AC的中点,

所以 $AC = 2AB = 4$ cm.

因为 $AD = AC$,

所以 $CD = 2AC = 8$ cm.

②因为 $BD = AD + AB = 4 + 2 = 6$ (cm), P是线段BD的中点,

所以 $BP = \frac{1}{2}BD = 3$ cm.

所以 $CP = CB + BP = 2 + 3 = 5$ (cm).

12. 解:(1) -6 $8 - 5t$

(2)由题意知 $AP = 5t$, $BP = 3t$.

因为 $AP - BP = AB$,


所以 $5t - 3t = 14$,

解得 $t = 7$.

所以t为7时,点P追上点Q.

(3)线段MN的长度不变.分两种情况:

①当点P运动到A,B两点之间时,如图(1).




(1)

第12题解图

$MN = MP + NP = \frac{1}{2}AP + \frac{1}{2}BP = \frac{1}{2}(AP + BP) =$

$\frac{1}{2}AB = 7$.

②当点P运动到点B的左侧时,如图(2).



(2)

第12题解图

$MN = MP - NP = \frac{1}{2}AP - \frac{1}{2}BP = \frac{1}{2}(AP - BP) =$

$\frac{1}{2}AB = 7$.

综上所述,线段MN的长度不发生变化,其值为7.

6.3 角

第1课时 角的概念

【课堂导学】

任务一

探究1 解:角.


探究2 略

探究3 解:射线.有公共顶点.

探究4 解:有公共端点的两条射线组成的图形叫作角.

探究5 解:公共端点叫作角的顶点,两条射线叫作角的边.

探究6 解:如图,分别形成平角、周角.



探究7 解:角也可以看成是一条射线绕着它的端点旋转而成的图形.

新知生成 $\angle AOB$ 或 $\angle BOA$ $\angle O$ 一个 $\angle \alpha$ $\angle 1$

[即时测评]

解:不能,因为以 O 为顶点的角不止 $\angle \alpha$ 一个角.
 $\angle \alpha$ 还可以表示为 $\angle AOB$.

任务二

探究1 略

探究2 360 180 60 60

探究3 (1)57 19 12 (2)17.11

[即时测评]

1. (1)300 18 000 (2)38 9 (3)0.6 0.01

2. 解: $38^\circ 15' = 38.25^\circ$,


所以 $38^\circ 15' \neq 38.15^\circ$.

因为 $38.25^\circ > 38.15^\circ$,

所以 $38^\circ 15' > 38.15^\circ$.

任务三

例 解:如图,射线 OB , 射线 OC 即为所求.



[即时测评]

(1)北偏东 40° (2)北偏西 65° (3)南偏西 45° (西南)
 (4)南偏东 20°

【课堂小结】

公共端点 射线 旋转 60 60 北或南 偏东或偏西

【当堂检测】

1. D 2. A 3. (1)× (2)× (3)√ 4. ①③⑥

【课后评价】

1. A 2. C 3. B 4. A 5. A 6. D 7. A 8. B

9. C 10. A 11. 北偏西 60° 12. 30

13. 解: (1)不正确.以 A 为顶点的角有 3 个,故不能用 $\angle A$ 表示,可表示为 $\angle DAC$.

(2)图中 $\angle B$ 可以用一个字母表示.

(3)以 A 为顶点的角有 3 个,分别是 $\angle BAC$, $\angle BAD$, $\angle DAC$.

(4)不是同一个角,因为这两个角的顶点不同.

14. 解: (1) 130°

(2)设从 4:00 到 5:00,经过 x min,时针与分针成 35° 角.

①当分针在时针上方时,

$$6^\circ x - 0.5^\circ x = 120^\circ - 35^\circ,$$

$$\text{解得 } x = \frac{170}{11}.$$

②当分针在时针下方时,

$$6^\circ x - 0.5^\circ x = 120^\circ + 35^\circ,$$

$$\text{解得 } x = \frac{310}{11}.$$

所以从 4:00 到 5:00,时针与分针夹角为 35° 的时刻为

$$4 \text{ 时 } \frac{170}{11} \text{ 分或 } 4 \text{ 时 } \frac{310}{11} \text{ 分}.$$

【课堂导学】

任务一

回顾复习 解:度量法、叠合法.

探究1 解:有度量法和叠合法两种方法.

探究2 解:图(1)中 $\angle AOB < \angle A'O'B'$,

图(2)中 $\angle AOB = \angle A'O'B'$,

图(3)中 $\angle AOB > \angle A'O'B'$.

探究3 解:图中有 3 个角,分别为 $\angle AOC$, $\angle AOB$, $\angle BOC$.

$\angle AOC$ 是 $\angle AOB$ 与 $\angle BOC$ 的和,记作 $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$;

$\angle AOB$ 是 $\angle AOC$ 与 $\angle BOC$ 的差,记作 $\angle AOB = \angle AOC - \angle BOC$;

类似地, $\angle AOC - \angle AOB = \angle BOC$.

[即时测评]

1. B

2. (1) $\angle BOC$ (2) $\angle BOC$ (3) $\angle COD$ (4) $\angle AOD$ $\angle AOB$ $\angle COD$
 (5) $\angle AOD$

任务二

例 解:由题意,得 $\angle AOB$ 是平角,

所以 $\angle BOC = \angle AOB - \angle AOC = 180^\circ - 52^\circ 37' = 127^\circ 23'$.

[即时测评]

1. 34° 2. 10°

3. 解: (1)原式 $= 20^\circ \times 8 + 30' \times 8 = 160^\circ 240' = 164^\circ$.

(2)原式 $= 102^\circ \div 3 + 43' \div 3 = 34^\circ + 14' + \frac{1}{3} \times 60'' = 34^\circ 14' 20''$.


【课堂小结】

度量法 叠合法

【当堂检测】

1. C 2. D

3. C 解析:如图(1),当 OC 在 $\angle AOB$ 的内部时, $\angle AOC = 50^\circ - 32^\circ = 18^\circ$;



第3题解图

如图(2),当 OC 在 $\angle AOB$ 的外部时, $\angle AOC = 50^\circ + 32^\circ = 82^\circ$.

综上所述, $\angle AOC$ 的度数是 18° 或 82° .

【课后评价】

1. C 2. A 3. B 4. D 5. D

6. C 解析: ①当 OC 在 $\angle AOB$ 内部时,

$$\angle AOC = \angle AOB - \angle BOC = 70^\circ - 20^\circ = 50^\circ.$$

②当 OC 在 $\angle AOB$ 外部时,

$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC = 70^\circ + 20^\circ = 90^\circ.$$

综上所述, $\angle AOC$ 的度数为 50° 或 90° .

7. B 8. B 9. A 10. A 11. 118°

12. 解: 设 $\angle AOB = x^\circ$, 则 $\angle BOC = (3x - 10)^\circ$.

由题意,得 $x^\circ + (3x - 10)^\circ = 86^\circ$,

解得 $x = 24$.

所以 $\angle BOC = (3x - 10)^\circ = (3 \times 24 - 10)^\circ = 62^\circ$,

即 $\angle BOC$ 的度数是 62° .

13. 解: (1)若 $\angle DCE = 35^\circ$,

因为 $\angle ACD = 90^\circ$,

所以 $\angle ACE = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

因为 $\angle BCE = 90^\circ$,
 所以 $\angle ACB = \angle ACE + \angle BCE = 55^\circ + 90^\circ = 145^\circ$.
 若 $\angle ACB = 140^\circ$,
 因为 $\angle BCE = 90^\circ$,
 所以 $\angle ACE = 140^\circ - 90^\circ = 50^\circ$.
 因为 $\angle ACD = 90^\circ$,
 所以 $\angle DCE = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$.
 故答案为 $145^\circ; 40^\circ$.
 (2) $\angle ACB + \angle DCE = 180^\circ$. 理由如下:
 因为 $\angle ACB = \angle ACD + \angle BCD = 90^\circ + \angle BCD$,
 所以 $\angle ACB + \angle DCE = 90^\circ + \angle BCD + \angle DCE = 90^\circ + \angle BCE = 180^\circ$.
 (3) $\angle DAB + \angle CAE = 120^\circ$. 理由如下:
 因为 $\angle DAB = \angle DAC + \angle CAB = 60^\circ + \angle CAB$,
 所以 $\angle DAB + \angle CAE = 60^\circ + \angle CAB + \angle CAE = 60^\circ + \angle EAB = 120^\circ$.
 (4) $\angle AOD + \angle BOC = \alpha + \beta$.

第3课时 角的平分线

【课堂导学】

任务一

探究1 解: 折痕 OC 将 $\angle AOB$ 分为相等的两个角.

探究2 (1)20 (2)25 (3)30

探究3 解: 相等.

新知生成 (1)相等 (2) OB OC

【即时测评】

D

任务二

例 解: (1) 因为 OB 是 $\angle AOC$ 的平分线, $\angle AOC = 80^\circ$,

所以 $\angle BOC = \frac{1}{2} \angle AOC = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$.

(2) 因为 OB 是 $\angle AOC$ 的平分线, 所以 $\angle BOC = \angle AOB = 40^\circ$.

因为 OD 是 $\angle COE$ 的平分线, 所以 $\angle COD = \angle DOE = 30^\circ$.

所以 $\angle BOD = \angle BOC + \angle COD = 40^\circ + 30^\circ = 70^\circ$.

(3) 因为 $\angle COD = 30^\circ$, OD 是 $\angle COE$ 的平分线,

所以 $\angle COE = 2\angle COD = 60^\circ$.

所以 $\angle AOC = \angle AOE - \angle COE = 140^\circ - 60^\circ = 80^\circ$.

因为 OB 是 $\angle AOC$ 的平分线,

所以 $\angle AOB = \frac{1}{2} \angle AOC = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$.

【即时测评】

B

【当堂检测】

1. C

2. 解: 因为 $\angle AOD = 82^\circ$, $\angle COD = 26^\circ$,

所以 $\angle AOC = \angle AOD - \angle COD = 56^\circ$.

因为 OB 平分 $\angle AOC$,

所以 $\angle BOC = \frac{1}{2} \angle AOC = 28^\circ$.

所以 $\angle BOD = \angle COD + \angle BOC = 26^\circ + 28^\circ = 54^\circ$.

【课后评价】

1. C 2. C 3. D 4. A 5. 22.5° 6. B

7. D 解析: 因为点 A, O, B 依次在同一直线上,

所以 $\angle AOB = 180^\circ$.

因为射线 OC 平分 $\angle AOB$,

所以 $\angle BOC = \frac{1}{2} \angle AOB = 90^\circ$.


当 OD 在 $\angle BOC$ 内部时, 如图(1).

$\angle BOD = \angle BOC - \angle COD = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$.

因为 OE 平分 $\angle BOD$,

所以 $\angle DOE = \frac{1}{2} \angle BOD = 35^\circ$.

所以 $\angle COE = \angle COD + \angle DOE = 20^\circ + 35^\circ = 55^\circ$.



第7题解图

当 OD 在 $\angle BOC$ 外部时, 如图(2).

$\angle BOD = \angle BOC + \angle COD = 90^\circ + 20^\circ = 110^\circ$.

因为 OE 平分 $\angle BOD$,

所以 $\angle DOE = \frac{1}{2} \angle BOD = 55^\circ$.

所以 $\angle COE = \angle DOE - \angle COD = 55^\circ - 20^\circ = 35^\circ$.

综上所述, $\angle COE$ 的度数是 55° 或 35° .

8. A 解析: 由折叠可知, $\angle BDC = \angle BDE$, $\angle EDF = \angle GDF$,

因为 DG 平分 $\angle ADB$,

所以 $\angle BDG = \angle GDF$.

所以 $\angle EDF = \angle BDG$.

所以 $\angle BDE = \angle EDF + \angle GDF + \angle BDG = 3\angle GDF$.

所以 $\angle BDC = \angle BDE = 3\angle GDF$,

$\angle BDA = \angle GDF + \angle BDG = 2\angle GDF$.

所以 $\angle BDC + \angle BDA = 3\angle GDF + 2\angle GDF = 5\angle GDF = 90^\circ$.

所以 $\angle GDF = 18^\circ$.

所以 $\angle EDF = \angle GDF = 18^\circ$.

9. C 10. 120° 11. 62°

12. 解: (1) 因为 $\angle DOC = 90^\circ$, $\angle DOE = 150^\circ$,

所以 $\angle COE = \angle DOE - \angle DOC = 150^\circ - 90^\circ = 60^\circ$.

又因为射线 OE 平分 $\angle BOC$,

所以 $\angle BOC = 2\angle COE = 2 \times 60^\circ = 120^\circ$.

所以 $\angle AOC = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

(2) 因为 $\angle DOC = 90^\circ$, $\angle DOE = \alpha$,

所以 $\angle COE = \angle DOE - \angle DOC = \alpha - 90^\circ$.

又因为射线 OE 平分 $\angle BOC$,

所以 $\angle BOC = 2\angle COE = 2(\alpha - 90^\circ) = 2\alpha - 180^\circ$.

所以 $\angle AOC = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - (2\alpha - 180^\circ) = 360^\circ - 2\alpha$.

所以 $\angle AOD = \angle DOC - \angle AOC = 90^\circ - (360^\circ - 2\alpha) = 2\alpha - 270^\circ$.

13. 解: (1) 40°

(2) 因为 OM, ON 分别是 $\angle AOB, \angle AOC$ 的平分线, 且 $\angle AOB = \alpha, \angle AOC = \beta$,

所以 $\angle AOM = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \alpha$, $\angle AON = \frac{1}{2} \angle AOC = \frac{1}{2} \beta$.

所以 $\angle MON = \angle AOM - \angle AON = \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$.

(3) $\angle MON = \frac{1}{2} \angle BOC$. 理由如下:

因为射线 OC 在 $\angle AOB$ 的内部, OM, ON 分别是 $\angle AOB, \angle AOC$ 的平分线,

所以 $\angle AOM = \frac{1}{2} \angle AOB$, $\angle AON = \frac{1}{2} \angle AOC$.

所以 $\angle MON = \angle AOM - \angle AON = \frac{1}{2}(\angle AOB - \angle AOC) = \frac{1}{2} \angle BOC$.

【课堂导学】

任务一

(1) 180° (2) 90° (3) 180° (4) 90°

问题探究 解: (2)(4)为一组, 它们的和都是 90° , (1)(3)为一组, 它们的和都是 180° .

新知生成 (1)互为余角 互余 余角 (2)互为补角 互补 补角

[即时测评]

B

任务二

探究1 解: $\angle 2 = \angle 3$. 理由如下:

因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$, $\angle 3$ 都互为补角,

所以 $\angle 2 = 180^\circ - \angle 1$, $\angle 3 = 180^\circ - \angle 1$.

所以 $\angle 2 = \angle 3$.

探究2 解: $\angle 2 = \angle 4$. 理由如下:

因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补, $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 互补,

所以 $\angle 2 = 180^\circ - \angle 1$, $\angle 4 = 180^\circ - \angle 3$.

因为 $\angle 1 = \angle 3$,

所以 $\angle 2 = \angle 4$.

探究3 解: 结论依然成立.

新知生成 相等 相等

[即时测评]

1. 9

2. 解: 设这个锐角的度数为 x° .

根据题意, 得 $180 - x = 3(90 - x)$,

解得 $x = 45$.

故这个锐角的度数为 45° .

【课堂小结】

90° 180° 余角 补角

【当堂检测】

1. C

2. 解: (1)相等. 理由如下:

因为 $\angle COD = 90^\circ$,

所以 $\angle 1 = 90^\circ - \angle BOC$.

因为 $\angle AOB = 90^\circ$,

所以 $\angle 2 = 90^\circ - \angle BOC$.

所以 $\angle 1 = \angle 2$.

(2)相等. 理由如下:

因为点 M, E, N 在同一条直线上,

所以 $\angle MEN = 180^\circ$.

所以 $\angle 2 = 180^\circ - \angle PEN$.

因为点 P, E, Q 在同一条直线上,

所以 $\angle PEQ = 180^\circ$. 所以 $\angle 1 = 180^\circ - \angle PEN$.

所以 $\angle 1 = \angle 2$.

【课后评价】

1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. A 7. A 8. B

9. D 解析: 因为 $\angle 3 + \angle BOC = \angle DOB + \angle BOC = 90^\circ$,

所以 $\angle 3 = \angle BOD$.

因为 $\angle EOD + \angle 1 = 90^\circ$,

所以 $\angle BOD - \angle 2 + \angle 1 = 90^\circ$.

所以 $\angle 3 - \angle 2 + \angle 1 = 90^\circ$.

10. D 11. 33°

12. 解: (1) $\angle 1 = \angle 3$. 理由如下:

因为 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$, $\angle 2 + \angle 3 = 90^\circ$,

所以 $\angle 1 = 90^\circ - \angle 2$, $\angle 3 = 90^\circ - \angle 2$.

所以 $\angle 1 = \angle 3$.

(2) $\angle 1 + \angle 4 = 90^\circ$. 理由如下:

因为 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$, $\angle 1 + \angle 4 = 90^\circ$,

所以 $\angle 2 = \angle 4$.

13. 解: 因为 $\angle AOD = 90^\circ$, $\angle COD = 39^\circ$,

所以 $\angle AOC = \angle AOD + \angle COD = 90^\circ + 39^\circ = 129^\circ$.

因为 $\angle AOD + \angle COD + \angle BOC + \angle AOB = 360^\circ$,

所以 $\angle AOB = 360^\circ - \angle AOD - \angle COD - \angle BOC = 360^\circ - 90^\circ - 39^\circ - 90^\circ = 141^\circ$.

14. 解: (1) $\angle AOC = \angle BOD$. 理由如下:

因为 $\angle BOD$ 与 $\angle BOC$ 互补,

所以 $\angle BOD + \angle BOC = 180^\circ$.


因为 $\angle AOC + \angle BOC = 180^\circ$,

所以 $\angle AOC = \angle BOD$.

(2) ①如图.

因为 $\angle AOC$ 与 $\angle MON$ 互余,

所以 $\angle MON = 90^\circ - \angle AOC = 58^\circ$.



② $\angle AON = \angle DON$. 理由如下:

如图.

因为 OM 平分 $\angle AOC$,

所以 $\angle COM = \angle AOM$, 所以 $\angle AOC = 2\angle AOM$.

因为 $\angle AOC$ 与 $\angle MON$ 互余,

所以 $\angle AOC + \angle MON = 90^\circ$.

所以 $\angle AON = 90^\circ - \angle COM = 90^\circ - \angle AOM$.

所以 $\angle CON = \angle MON - \angle COM = 90^\circ - \angle AOC - \angle COM = 90^\circ - 3\angle AOM$.

由(1)得 $\angle BOD = \angle AOC = 2\angle AOM$,

所以 $\angle DON = 180^\circ - \angle CON - 2\angle BOD$

$= 180^\circ - (90^\circ - 3\angle AOM) - 4\angle AOM$

$= 90^\circ - \angle AOM$.

所以 $\angle AON = \angle DON$.

综合素养评价(二)

1. A 2. D 3. D 4. B 5. C 6. D 7. C 8. B


9. D 10. D 11. 3 12. -1 13. -2 024

14. -1 15. 1 16. 30

17. 解: (1) 原式 $= -16 + 15 - 10 = -11$.

(2) 原式 $= -25 + 2 + 32 = 9$.

18. 解: (1)(2)(3) 如图所示.



19. 解: $\angle ABD = \angle ABC + \angle CBD = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$.

因为 BP 平分 $\angle ABD$,

所以 $\angle ABP = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$.

20. 解: (1) $2(x^2y + 3xy) - 3(x^3y - 1) - 2xy - 2$

$= 2x^2y + 6xy - 3x^3y + 3 - 2xy - 2$

$= 2x^2y + 4xy - 3x^3y + 1$.

当 $x = -2$, $y = 2$ 时,

原式 $= 2 \times (-2)^2 \times 2 + 4 \times (-2) \times 2 - 3 \times (-2)^3 \times 2 + 1$

$= 2 \times 4 \times 2 + (-16) - 3 \times (-8) \times 2 + 1$

$= 16 + (-16) - (-48) + 1$

$= 49$.

(2) $\frac{5y+4}{3} + \frac{y-1}{4} = 2 - \frac{5y-3}{12}$.

去分母, 得 $4(5y+4) + 3(y-1) = 24 - (5y-3)$.

去括号, 得 $20y + 16 + 3y - 3 = 24 - 5y + 3$.


移项, 得 $20y+3y+5y=24+3+3-16$.

合并同类项, 得 $28y=14$.

系数化为 1, 得 $y=\frac{1}{2}$.

21. 解: 在原正方体中, 和“ x ”相对的面是“6”, 和“ y ”相对的面是“-3”, 和“ z ”相对的面是“-5”.
因为在原正方体中, 相对的两个面上的数字之和为 5,
所以 $x+6=5$, $y+(-3)=5$, $z+(-5)=5$.
所以 $x=-1$, $y=8$, $z=10$.
所以 $(x+y)^2-z=(-1+8)^2-10=39$.

22. 解: (1) 如图所示.



从左边看 从上面看

(2) 根据题意, 得最底层有 6 个小正方体, 第二层有 3 个小正方体, 最上层有 1 个小正方体,
所以该立体图形由 10 个小正方体组成.
故答案为 10.

23. 解: (1) 因为 $a \odot b = a(a+b)-1$,

所以 $(-2) \odot 3 = \frac{1}{2}$

$$= (-2) \times \left[(-2) + 3 \frac{1}{2} \right] - 1$$

$$= (-2) \times \frac{3}{2} - 1$$

$$= -3 - 1$$

$$= -4.$$

(2) $3m+2+n$ (答案不唯一)

24. 解: (1) $a+b$ $a-b$

(2) $4a$

(3) 因为 $a=5m+3n$,

所以阴影部分的周长是 $4a=4(5m+3n)=20m+12n$.

25. 解: (1) 由题意, 得答对 1 题得 $100 \div 20 = 5$ (分),
答错 1 题得 $94 - 19 \times 5 = -1$ (分).

故答案为 5; 1.

(2) 设他答对了 x 道题, 则答错了 $(20-x)$ 道题.

由题意, 得 $5x + (20-x) \times (-1) = 76$,

解得 $x=16$.

答: 他答对了 16 道题.

(3) 不可能. 理由如下:

设他答对了 y 道题, 则答错了 $(20-y)$ 道题.

由题意, 得 $5y + (20-y) \times (-1) = 80$,

解得 $y = \frac{50}{3}$, 不符合题意.

所以参赛者说他得了 80 分, 是不可能的.

26. 解: (1) 若王老师一次性购物 600 元, 则他实际付款为 $500 \times 0.8 + (600 - 500) \times 0.7 = 470$ (元).

若王老师实际付款 160 元, 可设王老师一次性购物可能是 x 元.

① 当 $200 \leq x < 500$ 时,

根据题意, 得 $0.8x = 160$,

解得 $x = 200$;

② 当 $0 < x < 200$ 时,

$x = 160$.

综上所述, 王老师一次性购物可能是 160 元或 200 元.

故答案为 470; 160 或 200.

(2) 当 x 小于 500 但不小于 200 时, 他实际付款 $0.8x$ 元;

当 x 大于或等于 500 时, 他实际付款为 $500 \times 0.8 + 0.7(x - 500) = (0.7x + 50)$ 元.

故答案为 $0.8x$; $(0.7x + 50)$.

(3) 第一天购物实际付款 $0.8a$ 元,

第二天购物实际付款 $500 \times 0.8 + 0.7(850 - a - 500) = (645 - 0.7a)$ 元,

所以两天共付款 $0.8a + 645 - 0.7a = (0.1a + 645)$ 元.

当 $a = 250$ 时, $0.1a + 645 = 670$,

所以共节省 $850 - 670 = 180$ (元).

答: 这两天购物王老师实际一共付款 $(0.1a + 645)$ 元,

当 $a = 250$ 时, 王老师这两天一共节省了 180 元.

27. 解: (1) ① $OE = 0 - (-5) = 0 + 5 = 5$,

$EF = 3 - (-5) = 3 + 5 = 8$.

故答案为 5; 8.

② $m - (-26) = 2\ 026 - m$,

解得 $m = 1\ 000$.

故答案为 1 000.

(2) ① 由题意, 得 $MN = 2x + 8 - (-2) = 2x + 10$, $PM = -2 - x$.

因为 $MN = 4PM$,

所以 $2x + 10 = 4(-2 - x)$,

解得 $x = -3$.

所以 $2x + 8 = 2 \times (-3) + 8 = 2$.

所以点 P 表示的数为 -3, 点 N 表示的数为 2.

② 存在. 设点 Q 表示的数为 a , 由题意可知, 分三种情况讨论:

当点 Q 在点 P 左侧时,

由题意, 得 $(-3 - a) + (2 - a) = 3(-2 - a)$,

解得 $a = -5$.

当点 Q 在点 P 和点 N 之间时,

由题意, 得 $PQ + QN = [a - (-3)] + (2 - a) = 3 + 2 = 5$, $QM = |a - (-2)|$.

因为 $PQ + QN = 3QM$,

所以 $5 = 3|a - (-2)|$,

解得 $a = -\frac{1}{3}$ 或 $a = -\frac{11}{3}$ (舍去).

当点 Q 在点 N 的右侧时,

$PQ = a - (-3) = a + 3$, $QN = a - 2$,

$QM = a - (-2) = a + 2$,

所以 $a + 3 + a - 2 = 3(a + 2)$,

解得 $a = -5$ (舍去).

综上所述, 点 Q 表示的数为 -5 或 $-\frac{1}{3}$.